

中池見湿地保全活用計画策定委員会【第2回】

次 第

日時：平成26年11月12日（水）

13:30～15:30

場所：敦賀市東郷公民館 1階ホール

1. 開会

あいさつ (村上委員長)

2. 議事

議事1 前回議事の確認

議事2 ワーキンググループ開催報告

議事3 構想・基本計画書（案）の内容

議事4 今後のスケジュール

3. 閉会

あいさつ (山本副委員長)

(笹木副委員長)

第1回ワーキンググループ実施状況

- 実施日:平成26年7月7日(月)
 - 第一部 10:00~12:00
 - 第二部 13:30~16:30
- 場 所:中池見湿地
- 人 数:31人
- 内 容:
 - 第一部…現地視察
 - 第二部…室内会議
 - 議題1 これまでの経緯
 - 議題2 ワーキンググループの進め方
 - 議題3 構想内容:中池見湿地の自然環境
 - 議題4 構想内容:中池見湿地の保全・活用方針



1

第2回ワーキンググループ実施状況

- 実施日:平成26年8月7日(木)
 - 13:30~16:30
- 場 所:敦賀市東郷公民館
- 人 数:25人
- 内 容:室内会議
 - 議題1 前回WG会議のまとめ
 - 議題2 グループディスカッション
 - [保全検討グループ]
 - ① 第3章 中池見の「自然環境」の内容確認
 - ② 第6章 6.2 保全の基本方針 内容確認
 - ③ 第7章 中池見湿地の保全計画の概要
 - [活用検討グループ]
 - ① 前回のふりかえり
 - ② 活用メニューの絞り込みと具体化
 - ③ 活用の基本方針の設定
 - 議題3 全体報告



2

第3回ワーキンググループ実施状況

- 実施日:平成26年9月2日(火)
13:30~16:30
- 場 所:敦賀市東郷公民館
- 人 数:26人
- 内 容:室内会議
 - 議題1 前回WG会議のまとめ
 - 議題2 グループディスカッション
 - [保全検討グループ]
 - ① 第3章 中池見の「自然環境」の内容確認
 - ② 第6章 6.2 保全の基本方針 内容確認
 - ③ 第7章 7.1 中池見湿地の保全計画の概要
 - [活用検討グループ]
 - ① 第6章 6.3 保全活用計画の方針確認
「活用の目標」の確認
 - ② 第7章 7.2 中池見湿地の活用計画の概要
 - ③ 前回活用WSの具体化
 - 議題3 全体報告



ワーキンググループ案 報告会実施状況

- 実施日:平成26年10月8日(水)
19:00~22:00
- 場 所:敦賀市東郷公民館
- 人 数:23人
- 内 容:室内会議
 - ・中池見湿地保全活用計画【ワーキンググループ案】の確認
 - ・意見交換、質疑応答



中池見湿地保全活用計画策定委員会
第2回委員会
平成26年11月12日(水)

中池見湿地保全活用計画

～構想・基本計画書（案）～

平成〇〇年〇月

敦賀市

目 次

1 計画策定について	1
1.1 計画策定の目的	1
1.2 保全活用計画の策定フロー	1
2 これまでの経緯	3
3 中池見の自然環境と社会環境	4
3.1 中池見の概要	4
3.2 中池見の自然環境	5
3.3 中池見の社会環境	19
3.4 中池見湿地の現在の活用	23
3.5 中池見の関係法令	25
4 保全活用構想・計画の期間と対象とする範囲	26
4.1 計画の期間	26
4.2 対象とする範囲	26
5 自然環境保全活用上の問題点	27
5.1 問題点の整理にあたって	27
5.2 自然環境保全上の問題点	28
5.3 活用上の問題点	29
6 中池見湿地の保全活用の方針	30
6.1 保全活用の目的と将来像	30
6.2 保全の基本方針	31
6.3 活用の基本方針	40
7 中池見湿地の保全活用計画の概要	43
7.1 中池見湿地の保全計画の概要	43
7.2 中池見湿地の活用計画の概要	53
8 中池見湿地の維持管理・モニタリング計画	58

9 中池見湿地の保全活用の推進しくみ.....	65
9.1 保全活用の推進の流れ	65
9.2 保全活用に関わる役割分担	66

◆ 資料編

- ・資料 1 第 2 次敦賀市環境基本計画での位置づけ
- ・資料 2 近年の中池見湿地の保全・管理現状況

引用・参考文献

中池見湿地保全活用構想・計画策定までの経緯

1 計画策定について

1.1 計画策定の目的

世界的に貴重な泥炭湿地である中池見湿地では、江戸時代に新田開発されて以来、伝統的な水田耕作が営まれ、人と自然が共存した豊かな生態系の中で多様な生き物が育くまれてきました。

私たちみんなの「宝」であるこの中池見湿地を守り、次世代に引き継ぐとともに、文化・観光・教育・研究・交流の場となることを目指して、ラムサール条約の精神に基づき、中池見湿地に関わる関係者及び市民の主体性を行政が支援することを基調として、相互に連携・協働しながら保全・活用を進めていくための指針となる計画の策定を目的とします。


* 中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会（第13回）による

1.2 保全活用計画の策定フロー


中池見湿地保全活用計画は、中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会において確認された以下の内容に基づき、策定されることになりました。

また、中池見湿地保全活用計画は、これまでの経緯や中池見の自然環境と社会環境、自然環境保全活用上の問題点を整理した上で、保全活用の方針等を策定することとなりました。保全活用計画は、次頁の流れで策定することを確認しています。



1. 計画策定の目的




2. これまでの経緯




3. 中池見の自然環境と社会環境




4. 自然環境保全活用上の問題点




5. 中池見湿地の保全活用の方針



6. 中池見湿地の保全活用の概要



7. 保全活用に関する役割区分



2 これまでの経緯

中池見湿地は、平成 2 年～14 年 4 月までの期間、工業用地としての利用が検討されていました。平成 16 年からは、湿原として保全することとなっています。

中池見湿地の保全・活用をめぐるこれまでの経緯を下に記します。

平成 2 年 3 月	敦賀市第 4 次総合計画に工業団地構想を盛り込む
平成 4 年 6 月	LNG 基地の誘致を発表
平成 8 年 5 月	大阪ガス(株)から福井県及び敦賀市へ「環境影響評価書」提出
平成 9 年 4 月	環境保全エリア整備開始（観察エリア）
平成 9 年 8 月	農地転用許可
平成 13 年 12 月	日本の重要湿地 500 に選定（環境省）
平成 14 年 4 月	基地建設中止発表
平成 15 年 2 月	「中池見湿地総合学術調査報告書」発刊（国立環境研究所）
平成 15 年 11 月	NPO 法人ウエットランド中池見発足
平成 16 年 2 月	敦賀市と大阪ガス(株)で寄附などに関する協定締結
平成 16 年 8 月	中池見検討協議会（平成 18 年 8 月まで 8 回開催）
平成 17 年 3 月	用地及び関連施設等の寄附採納 福井県重要里地里山 30 に選定（福井県）
平成 18 年 8 月	中池見検討協議会から「中池見の保全、活用等の在り方について」提言
平成 18 年 11 月	福井県鳥獣保護区特定獣具使用禁止区域に指定
平成 19 年 2 月	中池見管理委員会（平成 21 年 12 月まで 5 回開催）
平成 19 年 7 月	福井県知事へ重要要望書提出
平成 20 年 5 月	NPO 法人中池見ねっと設立
平成 20 年 7 月	中池見湿地生物多様性保全協議会を設置し、湿性希少動植物の保全管理ならびに賢明な利活用事業開始（平成 22 年 3 月まで）
平成 21 年 3 月	中池見湿地整備基本計画策定
平成 22 年 4 月	NPO 法人中池見ねっとに管理運営業務委託
平成 24 年 3 月	自然保護協会・中池見ねっと・ウエットランド中池見・市共催によるワークショップを開催、「中池見・保全行動計画づくりワークショップの報告」越前加賀海岸国定公園へ編入
平成 24 年 7 月	ラムサール条約湿地に登録
平成 24 年 8 月	北陸新幹線ルート公表
平成 24 年 9 月	中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会（平成 26 年 3 月まで）

資料：「中池見の保全、活用等の在り方について」（中池見検討協議会、平成 18 年 8 月）に加筆

3 中池見の自然環境と社会環境

3.1 中池見の概要

中池見湿地は、周りを3つの山に囲まれた25ヘクタールほどの低層湿原です。低層湿原とは、地下水や河川水により水が供給される湿地で、尾瀬ヶ原や釧路湿原の一部に見られるような雨水に依存する高層湿原とはまた異なった環境です。湿地は、敦賀市街地の北東側（敦賀駅から約2km）に位置しており、谷が植物遺骸や土砂で埋められて出来上がった地形で、「袋状埋積谷」と呼ばれます。

地下には、40メートルにも及ぶ泥炭層が堆積しています。泥炭中に残されている花粉の分析などから、約5万年の気候変動が推定されています。

【中池見湿地の概要】

- 位置：福井県敦賀市樫曲
- 面積：87ha（湿地本体の面積25haと周囲の集水域、湿地の水が流出する後谷を含めた面積です。）
- 湿地タイプ：低層湿原、水田
- 法規制など：
 - 国定公園特別地域
 - ラムサール条約湿地
- アクセス：
 - JR敦賀駅より2キロ（徒歩25分）
 - JR敦賀駅より「コミュニティバス（東郷線）」または「ぐるっと敦賀周遊バス」にて「中池見口」で下車、徒歩5分
 - 北陸自動車道敦賀ICより、車5分



資料：敦賀市ホームページ (<http://www.city.tsuruga.lg.jp>) より編集

3.2 中池見の自然環境

(1) 中池見の自然環境

中池見は、雨水と集水域の小河川により涵養される低層湿原です。過去の湿原の植物の遺骸によって造られた泥炭層は年代が決定されている部分に限っても、約 27 m に達し、その起源は 5 万年前に遡ります (Okada; 1974、宮本他; 1995、Miyamoto et al.; 1996)。湿原が水田として利用され始めたのは、江戸時代後期だと考えられています (平松; 1973、岡田; 1983)。それ以前は、杉林も混じる沼地だったようです (平松; 1973、植田・辻; 1994)。稲作の最盛期には、湿原全体が水田として使われていました。しかし、後継者不足や生産調整のために、1950 年代から水田の放棄が始まり、1994 年頃には、耕作水田は、1/5 程に減少し (下田; 1998、池田・三浦; 2000)、今では、試験的に小規模な耕作が行われる程度です。

中池見の自然環境や動植物の特徴が注目されたのは、1992 年に大阪ガスの液化天然ガス基地の誘致がきっかけでした。事業者の環境影響評価書 (大阪ガス; 1996)、国立環境研究所の学術調査 (野原・河野; 2003)、地元の共有地トラスト運動等により、湿原の価値が広く知られるようになりました。その後、事業は中止となり、中池見の買収地は 2005 年に敦賀市に寄付され、2012 年にラムサール条約湿地として登録されました (笹木; 2013)。

中池見の自然の価値は、水棲生物や集水域の生物の多様性にあるとされています (河野; 1998)。両生・爬虫類 (神松他; 2000)、魚類 (山野他; 2003)、昆虫 (保科他; 2007、平井他; 2013)、高等植物 (角野; 1998、下田・中本; 2003)、蘚苔類 (黒田他; 2006)、藻類 (野崎他; 1998、辻他; 1999) などの多くの調査資料が残されています。現在、中池見は、環境省・モニタリング 1000 事業 (里山) のコア・サイトなり、鳥類、植物、水環境等の生息調査が定期的に行われています。また、福井県内外の研究者により、動植物の研究の場としても活用されています。



中池見湿地(南から北方向の眺望)

中池見を完模式標本産地とする生物、つまり中池見で発見された新種には、キタノメダカ (Asai et. al; 2011)、ナカイケミヒメテントウ (佐々治・岸本; 1996)、タケダウスゲガムシ (Hoshina and Satô ; 2005) の3種があります。

生物の多様性は、棲息環境の多様性に依存します。水環境を例にとれば、湧水、湿原、池、河川、農業用水路など自然の、また人工的に作られた多様な水域が中池見には見られます。湿原を涵養する水は、基盤となる地質の違いからそれぞれ水質が異なるし、また人の利用により、さらに変化します。それらの生息域は互いに繋がり合い、動植物は、それぞれの生活史に応じて生息の場を利用します。中池見の保全の対象は、湿原の本体だけではなく、その集水域、付属する後谷湿地、湿原の水が流出する木の芽川も含めた区域になります。

生息場の多様性とともに、中池見の歴史も生物の多様性の維持に寄与していると思われます。本来の地理的、地形的な特性は、夏季の低水温と貧栄養な湿原環境を特徴付け、ミツガシワなどの北方系の生物を残してきました。一方、水田利用は、デンジソウ等の、かつては水田雑草とされてきた植物の生息場を作り出しました。さらに、放棄された水田跡にはヨシが侵入し、ノジコ等の野鳥の餌場として利用されています。本来の湿原環境、水田、ノジコの生息場のいずれもラムサール湿地の登録要件とされたものです。

(2) 地形・地質

中池見湿地は袋状埋積谷（ふくろじょうまいせきこく）に形成された、標高約45mの内陸低湿地です。袋状埋積谷とは、断層活動などに伴い、谷がせき止められたために形成された窪地が堆積物によって埋め立てられ、形成される盆地状の地形です。中池見湿地では、周囲を天筒山（171.3m）をはじめとする低い山々に囲まれた集水面積の狭い窪地であるため、流れ込む大きな川ではなく、土砂はあまり流れ込んできませんでした。このため窪地は土砂で埋め立てられてしまうことはほとんどなく、長い間、泥炭が堆積してきました。現在、中池見湿地では約27mの厚さのほぼ連続した泥炭層が確認されており、過去約5万年の気候変動・植生変化が分析されています（宮本ほか、1995）。

この中池見湿地を作る原因となった断層は、湿地の東縁部に南北に通ると推定されており、池見断層と呼ばれています（杉山ほか、2012）。また中池見湿地周辺の山地を構成する岩盤は、中生代の砂岩、頁岩、チャート等であり、北西側には石灰岩も分布しています（福井県、2010）。



図 中池見湿地とその周辺地域の地質図

出典：福井県（2010）



1948年（昭和23年）撮影の中池見湿地

出典：国土地理院



図 池見断層の位置

出典：杉山ほか（2012）

(3) 水環境

中池見湿地は、集水域に降る雨水で涵養されています。雨水の多くは、一旦地中に浸透するため、湿地への流入水は、集水域の地質や、再び湧出するまでの時間により、水質や水温が変化し、場所ごとに多様な水環境を形成します。湿地の西側の流入水は、基盤の石灰岩のために、pH やカルシウム・イオン濃度が高く、一方、東部からの流入水は、低い傾向にあります。辻ほか（2003）の観測によれば、西部からの流入水は、pH が 7~8、カルシウム・イオン濃度は、12~20 mg/L ですが、東部からのそれは、pH が 6 前後、カルシウム・イオン濃度は 5 mg/L 以下です。

湿原に流入した水は、湿地に堆積した泥炭や植物遺骸に由来する腐植物のために、茶褐色に着色します。pH や導電率は、さらに低くなり、pH は 6 以下、カルシウム・イオン濃度も 1~2 mg/L に低下する地点もあります。この低下は、カルシウムなどの陽イオンが、湿原内の植物遺骸に由来する腐植質と結合し、水から取り除かれるためだと考えられます。また、窒素や燐などの栄養分の濃度も、湿原内では低い傾向にあり、特に、雨水や河川水に含まれる硝酸イオンは、ほとんど検出されなくなります。栄養分が不足する貧栄養の環境は、湿原の水環境の重要な特徴です。

湿地は、流入水により年間を通して湿潤状態が保たれており、西から東に流れる数本の「江」と呼ばれる人工的な水路により、中池見湿地の外へ流出します。

湿地内に見られる池は、バイパス工事の際に捨てられた残土の重みで湿地が沈下した後に形成されたものです。形成以後、その面積は拡大する傾向にあります。2000 年頃までは湿地の中で水田耕作が営まれていました、現在は、小規模に試験的な耕作が行われているのみです。

地中に浸透し、再び湧き出す水の温度は、田植えの頃には、河川水と異なり、稻作に不都合な 15°C 程の低い温度になります。そのために、中池見では、「ひよせ」と呼ばれる水温上昇のための溜池が作られました。「ひよせ」や田圃を通過した水は、著しく温度が上昇し、30°C にも達します。本来の湧水由来の冷水が流れ込む場所や、稻作により温まった水で涵養される水域では、それぞれの水温を好む異なった植物群集が発達し、湿原全体の植生の多様性を増します。





図 湧水、ひよせ、田圃排水の水温の日変動

水田の田越灌漑やその水源となる溜池（ひよせ）により、湿原に流れ込む水の温度は著しく高くなり、自然の要因に加え、人の活動により、湿原内の水環境の多様化はさらに増します。

TOPICS

深い泥炭層からわかること。

中池見で採掘されたボーリングコアは、精緻な花粉分析が行われています。花粉分析からは、その当時、どのような植物が生育していたかを伺い知ることができます。中池見のボーリングコアからは、5万年～現在に至るまでの植生の変遷がわかっており、代表的な時代区分ごとに植生の様子が再現されています。



出典：中池見ビジターセンター展示パネル（安田 喜憲氏監修）
※Miyamoto 他 (1996) をもとに作図されている

【5万年前の中池見】

この時代の中池見の湿地部分は、現在よりもずっと低い位置にあり、面積も小さかったようです。花粉分析の結果から、湿地にはヨシやガマ類、セリ科の植物が生え、所々にハンノキが生えていたようです。また、ツガ、スギなどの常緑針葉樹が高い割合で出現していることから、この時代は涼しくて湿った気候であり、中池見とその周辺の山地部は、現在の亜高山にみられる常緑針葉樹林が広がっていたと考えられます。



【2万年前の中池見】

約2万年前は最終氷期の最盛期であり、地球の全陸地の約30%が氷河で覆われていました。海水面は現在より100mほど低く、日本とユーラシア大陸は陸続きであったと考えられています。この時代にはモミ、ツガ、カバノキなどの花粉が多く出現しているため、寒冷で乾燥した気候であり、中池見周辺の森林は、常緑針葉樹林であったと考えられます。また、湿地は一面をヨシで覆われ、水辺には、カヤツリグサ科の植物や、ミズバショウなどが生育していましたようです。



【6千年前の中池見】

この時代の年平均気温は、現在より2~3℃ほど高く、暖かかつたようです。この温暖な気候のため、海水面は現在より3~5m高く、日本はユーラシア大陸と海で隔てられていたと考えられています。この時代は、シイ類やカシ類などの常緑広葉樹の花粉が高い割合で出現していることから、約6千年前の中池見周辺の森林には、暖かく湿潤な地域に生育するシイ類やカシ類などの繁る常緑広葉樹林が発達していたようです。また、湿地部分は、現在に近い地形となり、ハンノキが一面を覆っていたようです。後で紹介する鳥浜貝塚（若狭町）が栄えたのは、このころです。



【3千年前の中池見】

約3千年前は、スギの花粉の割合が高くなります。中池見全域で、スギの「根木」がみられることがからも、この時代はスギが広範囲に分布していたようです。このスギの増加は、この時代が雨の多い湿潤な気候であったことを示しています。この頃の中池見は、現在とほぼ同様の地形になっており、湿地部と山地部の全域がスギで覆われた「スギの時代」であったといえます。



中池見の泥炭層を用いた花粉分析から、約3千年前にはスギがたくさん生えていたことが推測されています。実際に、中池見の地下には、「根木」と呼ばれるスギの根株が全域に分布しています。これらのC14年代測定でも、約3000年前のものであることが判明しています。

資料：中池見ビジターセンター展示パネル（安田 喜憲氏監修）

(4) 動物

1) ほ乳類

中池見湿地と周辺部の丘陵地の森林に生息するほ乳類についての現地調査は、おもに1999～2002年の期間に行われており、ここで、ツキノワグマ、ニホンカモシカ、イノシシ、ムササビ、カヤネズミ、ニホンリスなど7目12科17種の生息が確認されています（川道ほか、2003）。このなかで、中池見湿地の湿地部に広く分布するカヤネズミは、体重7～8gの日本最小のネズミであり、マコモやオギ等の高茎草本を営巣地とし、エサ植物としてイネ科低茎草本の繁茂する草原を要するとされます。中池見湿地でおこなわれているモニタリングサイト1000の調査によると、近年ではイノシシやニホンジカの出現が増える傾向にあります。



ニホンカモシカ



ノウサギ



イノシシ

2) 鳥類


中池見湿地付近における鳥類調査は、1999～2002年の現地調査（吉田ほか、2003）以降も行われ、17目50科168種が確認されています。ミサゴ、サシバ等の生態系の上位に位置する猛禽類15種をはじめ、オシドリ、ミヅゴイ、ヒクイナ、マキノセンニュウ等の環境省レッドリスト（2012年）27種を含み、アリスイ等、県内では珍しい鳥の記録も少なくありません。「渡り」の中継地として利用する鳥類が多いことが特徴の一つで、アオジ、オオジュリン等のホオジロ類、コヨシキリ、ノゴマ、ノビタキ等が多く、タカの渡りも観察されます。なかでも、ノジコについては環境省レッドリストの準絶滅危惧でありながら数多く記録され、全国でも有数の渡りの拠点として注目されています。



オシドリ（林内を移動）



ヒクイナ（12月にも確認）



ハヤブサ（食事）

TOPICS**中池見湿地と“ノジコ”**

ノジコ（学名：*Emberiza sulphurata* 英名：Japanese yellow bunting）は、スズメ目ホオジロ科ホオジロ属に分類される鳥類で、日本でのみ局地的に繁殖し、おもに国外で越冬します。福井県でも繁殖している可能性が高いのですが、確認できていません。減少していると言われ、IUCN レッドリストの絶滅危惧II類、環境省レッドリストの準絶滅危惧、福井県レッドリストの絶滅危惧II類に選定されています。

中池見がラムサール条約の登録湿地となる際、その要件の一つとして、中池見湿地がノジコの重要な渡りの拠点であることがあげられています。陸鳥（特に小鳥）の中継地が評価されるのは珍しく、具体的な対応が望まれます。

中池見では、渡りの季節（特に10月）に記録され、おもに中継地として利用されています。中池見湿地や後谷の湿地の植物の繁みの中にいることが多く、分かり易い声で鳴かないために観察が難しく、激減しても気付かない可能性があります。鳥類標識調査により、多い年には1000羽以上が確認され、全国的にも稀な事例となりました。渡りの時期、中池見にしばらく滞在する個体がいること、新潟県や長野県から来る個体がいること、中池見に再び戻って来る個体がいることなども、少しずつ分かってきました。

ノジコがさえずっていた年もあるため、繁殖する可能性もあると思われますが、越冬の可能性は、今のところ低いと考えられます。

このようなことから、中池見においては、渡りの季節（秋と春）及び繁殖期におけるノジコの生息環境を検討するべきと思われます。水がある所を好んでいるらしく、秋には下草があるヨシ原等で多く記録されるようですが、季節によって利用する環境が少し異なるようです。湿地及び湿地に接する林縁部の環境が重要と思われますが、詳細は調査中です。



ノジコ



ノジコの生息環境（標識調査）

3) 爬虫類・両生類

中池見湿地における爬虫類・両生類は、1999～2002年の現地調査により、爬虫類ではイシガメ、カナヘビ等の5種が確認されており、両生類ではニホンイモリ、ニホンアカガエル、トノサマガエル、モリアオガエルなど9種の生息が確認されています（野原ほか、2003）。これらの爬虫類・両生類のなかでは、環境省レッドリストにおいてイシガメ、トノサマガエルは絶滅危惧種として記載されています。中池見に生息する爬虫類・両生類は、多様性が高いことが指摘されています。



ニホンイモリ



イシガメ



トノサマガエル

4) 魚類

中池見湿地における魚類は、2010～2012年に行われた現地調査により、アブラボテ、ホトケドジョウ、キタノメダカなど4科12種の魚類が確認されています（山野ほか、2013）。これらの魚類のなかで、ホトケドジョウ、キタノメダカなど5種は、環境省レッドリストあるいは福井県レッドデータブックに記載のある絶滅危惧種です。中池見湿地という限られた範囲に、異なる生態学的特性を有する12種の魚類が確認されていることは、魚類の多様性の高さを示していると評価できます。特に、ホトケドジョウの生息場所である湧水湿地やアブラボテの繁殖場所となっている後谷水路は、当地の魚類相を維持するうえで重要であると指摘されています（山野ほか、2013）。また、キタノメダカについては、中池見が「模式産地」となっており、学術上貴重な位置づけとなっています。



アブラボテ



ホトケドジョウ



キタノメダカ

TOPICS**中池見湿地はメダカ研究でも“重要な湿地”**

ある生物が新種として記載される際に、その生物を定義するための記述（記載文、判別文）の拠り所となった標本や図解を「模式標本」といいます。模式標本は、基準標本、タイプ標本ともよばれます。そして、その模式標本を採集した場所は「模式産地」と呼ばれます。新たな「種」を決定づける模式標本と、その標本の採集地となる模式産地は、学術上重要であるといえます。

従来、日本国内の野生メダカは1種と考えられていました。しかし、近畿大学と神奈川県立生命の星・地球博物館との共同研究により、青森県から京都府の日本海側などに分布する「北日本集団」と、本州の太平洋側や九州などに生息する「南日本集団」の形態的特徴などが詳しく調べられ、中池見湿地で採集された個体が2011年12月にキタノメダカ (*Oryzias sakizumii* Asai, Senou and Hosoya, 2012 ("2011")) という新種の完模式標本としてドイツの魚類学専門誌に発表されました (Asaiほか、2011)。

なお、中池見は、キタノメダカのほかにナカイケミヒメテントウという昆虫の模式産地にも指定されています。




図 キタノメダカが新種として記載された論文に掲載された図

※ 中池見で採集されたものが掲示されています。

引用 : Asai ほか (2011)



キタノメダカの生息環境となる水路（中池見湿地）

5) 昆虫類

中池見湿地における昆虫類は、佐々治ほか（2003）において、それまでに行われた調査成果とあわせ、1,366種類が記録されています。これらの確認種のなかには、ゲンゴロウ、コガタノゲンゴロウをはじめ、多くの絶滅危惧種が含まれます。また、中池見湿地は、トンボ相の確認種が豊かであり、これまで記録された種としては、ハッチョウトンボ、モノサシトンボ、ヨツボシトンボなど10科70種があります（和田、2003）。その他、モニタリングサイト1000の調査によると、中池見湿地は、他の国内モニタリングサイトと比べてヘイケボタルの確認個体数が群を抜いて多い（2009～2011年データ）ことが確認されています（環境省、2014）。



ハッチョウトンボ



モノサシトンボ



ヘイケボタル

6) その他の生物

① 貝類

中池見湿地では、これまで 17 種の淡水貝類が確認されています。それらの中には、福井県内では三方五湖内でのみ過去の記録があるフネドブガイなども含まれているとされています（藤野ほか、2012）。2012 年に行われた藤野ほか（2012）による中池見湿地における淡水貝類の調査では、福井県産陸水生貝類目録に掲載されていないミズコハクガイ、ハブタエモノアラガイ、コシタカヒメモノアラガイ、コビトノボウシザラの 4 種の淡水貝類が新たに確認されています。なお、ミズコハクガイは環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に位置づけられており、休耕田に広く分布していることが確認されています。淡水貝類については、今後の調査研究により新たな種の発見に及ぶことも指摘されています。

② クモ類

中池見湿地におけるクモ類は、新海ほか（2003）において 171 種が記録されています。これまで確認されているクモ類のなかでは、スジブトハシリグモ、アオグロハシリブモ、ヤリグモなど、良好な自然環境が残されている地域であることの指標となるクモ類が多数確認されています。また、確認されたクモ類には、水辺環境、草原環境、樹林・林縁環境などそれぞれの環境を好むものなど、中池見湿地には多様な環境が備わることで多様なクモ類が生息していることが指摘されています。

③ ダニ類

中池見湿地におけるダニ類は、青木（2003）において、ササラダニ類を対象とした調査が報告されている。これによると、2002 年に行われたダニ類の調査により、22 種類のササラダニ類が確認されています。確認されたダニ類は、それぞれ生息環境を異にするものであり、中池見湿地の多様な環境を反映したものであることが指摘されています。また、オールオニダニ、オオカブトダニモドキ、カワノイチモンジダニなど、分布上注目すべき種の生息も確認されています。

(5) 植物と植生

① 植物と植生

中池見湿地では、オオアカウキクサ、デンジソウ、ミズトラノオやミズアオイなどの絶滅危惧種として数えられる水生・湿生植物が生育しており、これらの存在が、中池見をラムサール登録に導いた要件の一つとなっています。これらは、希少な植物であるものの、1960年代までは水田の「強害草」（笠原、1951）として位置づけていました。中池見では、江戸時代以降、開田がすすみ稻作が営まれてきましたが、泥深い立地から大型機械の導入が困難であったことや、水の動きによって除草剤の効果が薄められたことなどが、豊かな植物相が残った一因と指摘されています（池田、1977）。

一方、近年では、放棄田の植生の進行によって植物相の急激な変化が起こっており（角野、1998）、ヨシ群落、マコモ群落といった、高茎草本が卓越するようになり、オオアカウキクサ、デンジソウなどの生育環境は減少しています。




図 中池見の植生の推移（湿地部分）

引用：下田ほか（2003）

② 藻類及び微生物

中池見湿地では、腐植質に富み pH が低い湿原の水環境には、特殊な藻類群集が発達します。珪藻類のイチモンジケイソウ属 (*Eunotia*) やハネケイソウ属 (*Pinnularia* 属) が湿原環境を指標する代表的な藻類で、両属に含まれるたくさんの種類が中池見湿地に出現します。また、湿原内の水路で伏流水が多く湧き出す場所には、カワモズク類（紅藻類）が見られます。

湿原内では、鉄細菌により赤褐色の沈澱ができたり、水を赤く染める紅色硫黃細菌が池の中に発生したりして、特異な湿原の景観を形作っています。

3.3 中池見の社会環境

(1) 人文的歴史(古代から近代へ)

① 弥生時代の敦賀

敦賀市では、中、吉河、坂ノ下など、弥生時代の遺跡がいくつか発見されています。当時の敦賀平野は中央に入江が広がり、それに臨む南東部の湿地から稻作が始まっていたと考えられています。

その中でも代表的な吉河遺跡は、笙ノ川の形成した扇状地の北端付近に営まれた、弥生時代中期から後期の集落跡で、方形周溝墓が発見されています。また、出土品には壺や甕、器台などの多数の土器や、木器、石器の他、玉作りの道具や未製品がありました。

② 古代敦賀の製塩

敦賀では、古代、海水から塩をとる「土器製塩」が行われていました。

これは、天日にさらした海藻に、海水を繰り返しかけて塩分を濃縮し、土器で煮詰めて水分を蒸発させ、塩を作る方法です。こうした土器製塩は平安時代まで続けられました。

『万葉集』には、田結の浜で塩を焼く煙を船から眺める様子を詠んだ歌もあります。

③ 天筒山の戦いと池見

1570年（元亀元）4月25日、織田信長は、上洛の命を受け入れない越前の朝倉義景を討つため、朝倉景恒の手勢3千、氣比社家等の1,500騎が守備する敦賀の金ヶ崎・天筒両城を10万8千という大軍で攻撃しました。

朝倉方は、急峻な天筒山に連なる山々に堅固な郭や柵を設けていました。容易に攻略できないことを知った信長は、池見の沼を大堀と考え、防備を手薄にしている後方の池見方面から、彼自身先頭をきって攻め込みました。

④ 新田開発

江戸時代、農民の間から池見を開発して新田を造ろうとする動きが活発になりました。中池見の開発は、1686年（貞享3）樫曲村の庄屋九郎兵衛を中心に進められました。池見は沼地であり、その水を抜くことが先決と考え、まず四本の排水路を設ける工事にとりかかりました。この最新技法に期待をこめ、村人はこぞって参加しました。これにより、1690年ごろより池見は、田んぼとして利用されるようになりました。



図 敦賀の遺跡・製塩跡位置

⑤ 新田開発以降

新田開発の後も、中池見の水田開発は進み、やがて中池見全域で水田耕作が行われるようになりました。また、明治時代以降になると、客土などの土壤改良も試みられるようになりました。それでも、中池見は「深田」と呼ばれる泥深い湿田であり、田植えは目印に張った縄に沿って後退し苗を植えていました。また、特に泥深い田んぼでは、田下駄を履いて稻を刈り、田舟を使って稻を搬出していました（山本眞氏私信）。

昭和 44 年に打ち出された減反政策により、中池見での水田耕作は徐々に行われなくなりました。泥深い湿田であるため、農家にとっては大変な重労働であり中池見の水田での耕作を手放したためです。その後、平成 2 年には、敦賀市第 4 次総合計画において中池見が工業団地候補地となり、さらに平成 4 年には敦賀市議会により LNG 基地の誘致が発表されました。その後、大阪ガス株式会社により環境影響評価手続きが進められ、中池見湿地の南側の一部を LNG 基地開発の代償措置として環境保全エリアとして整備が進められ、平成 12 年より「中池見 人と自然のふれあいの里」として一般市民向けに開園されました。ところが、平成 14 年には LNG 基地計画は中止が発表され、平成 17 年には大阪ガス株式会社が取得した用地と施設のすべてを維持管理費とともに敦賀市に寄附されました。

その後、平成 24 年 7 月に、湿地として世界的に重要な湿地の一つとして評価されるに至り、ラムサール条約の登録湿地となりました。




図 上空からみた中池見の変遷

出典：国土地理院

(2) 中池見と周辺地域の観光利用

敦賀市では「世界をつなぐ港まち みんなで拓く交流拠点都市 敦賀」をキャッチコピーとした第6次敦賀市総合計画が平成23年度に策定されています。その柱として、「活力にあふれるまちづくり（産業観光関係）」が設定され、敦賀港やエネルギー産業といった敦賀市にしかない強みを活かした環境を創出することとされており、観光は敦賀市にとって大切な産業として位置づけられています。

中池見は、敦賀市街地から近く、JR敦賀駅から4km、北陸道敦賀ICから車で5分程度と、各種交通機関からアクセスのよい立地にあります。また、中池見の近傍には、金崎宮といった歴史文化的活用による観光拠点のほか、気比の松原や池河内湿原といった、自然資源を活用した観光拠点が所在しています。

[中池見周辺地域における主要な観光拠点]

- ・金崎宮、金ヶ崎城跡
- ・氣比神宮
- ・天筒山城跡
- ・金ヶ崎緑地
- ・氣比の松原
- ・木の芽古道（中部北陸自然歩道）

表 中池見の周辺地域における散策等のルート

名称（整備主体）	内 容
中部北陸自然歩道 (環境省)	新潟県山北町から滋賀県大津市までの雄大な山岳景観や日本海景観など多様性に富んだ歩道で、平成7年度から整備を始め、平成13年春に完成。中部北陸8県にまたがる旧街道の北国街道、三国街道、中山道をメインルートとした延長4,029km。
森林レクリエーションの森・天筒山風景林 (林野庁)	天筒山風景林（国有林）とその周辺一帯は、都市公園「金ヶ崎（天筒山）緑地」として歩道や展望台、トイレなどが整備されている。山頂の展望台からは、日本海側と中池見を展望することができる。



金ヶ崎緑地



気比の松原と松原海岸



木の芽古道




図 中池見周辺における主要な観光拠点及び自然歩道ルート

3.4 中池見湿地の現在の活用

(1) 中池見 人と自然のふれあいの里

中池見湿地は、現在、自然と触れ合う活動の拠点として活用されています。「中池見 人と自然のふれあいの里」への平成 25 年度の来園者数は約 27,000 名でした。来園者数は、ラムサール条約湿地登録後増加傾向が続き、平成 24 年度に比べると約 30% 増となっています。また、平成 12 年開園以降の総来園者数は約 167,000 名となっています。近年では、ボランティア活動での来園団体数も増加し始めています。団体来園者の割合は、平成 25 年度で約 13% となっています。

「中池見人と自然のふれあいの里」では、ビジターセンターを中心に、施設管理運営団体 (NPO 法人中池見ねっと (平成 22 年より敦賀市が委託)) の企画・運営により、生き物学校田に取り組まれているほか、広報、企画展示、夏休み小中学生 1 日体験講座の開催、中池見フォトコンテスト、定例自然観察会など、一年を通じて中池見の自然を活かした催しが開催されています。




図 「中池見 人と自然のふれあいの里」年度別来園者数（平成 12～25 年度）



江堀作業



水路の自然観察

(2) 環境学習の拠点として活用

中池見湿地では、これまで、中池見湿地全域が動植物を中心とした自然観察や自然と親しむ場として活用されてきました。近年では、ビジターセンターを核に、一般市民を対象として田んぼを活用した里山体験（ミニ田んぼ、どろんこ田んぼ）の活用が活発になってきています。また、後谷においては、駐車場からの団体アクセスが良いため、敦賀市内・外の学校団体によって稻作体験と自然環境学習・研究を目的とした活用が定着しつつあります。さらに、江尻～蛇谷にかけては、NPO団体による水田環境の保全活動が展開されています。これらの田んぼとしての活用は、田んぼの作業体験を通じた中池見湿地の自然環境の継続的な保全にも貢献しています。




図 中池見湿地における現在の環境学習の拠点としての活用の状況（平成 26 年度）




3.5 中池見の関係法令

中池見湿地は、国・県レベルで重要な湿地として位置づけられ、平成24年3月に越前加賀海岸国定公園第2種特別地域に編入されました。また、同年7月にラムサール条約湿地に登録に登録され国際的に重要な湿地とも認められています。

[自然環境関連法令等指定状況]

- 平成13年12月 日本の重要湿地500に選定（環境省）
- 平成17年3月 福井県重要里地里山30に選定（福井県）
- 平成18年11月 福井県鳥獣保護区特定獣具使用禁止区域に指定
- 平成24年3月 越前加賀海岸国定公園第2種特別地域に編入
- 平成24年7月 ラムサール条約湿地に登録



[ラムサール条約の登録要件]

ラムサール条約では、国際的に重要な湿地を指定するための9つの基準があります。

中池見湿地は、基準1、基準2、基準3に該当するため、ラムサール条約湿地として登録されました。

◆国際登録基準

基準1：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又は希少なタイプの湿地
…特有の地形、約40mにおよぶ泥炭層の存在

基準2：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地
…国内有数のノジコ等の渡り

基準3：生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地
…2,000種を超える動植物の存在、デンジソウ・ヤナギヌカボ・ミズトラノオの生育

資料：“Information Sheet on Ramsar Wetlands” <http://www.ramsar.org/>

4 保全活用構想・計画の期間と対象とする範囲

4.1 計画の期間

中池見湿地保全活用計画は、20年、30年先を目指した中・長期的な計画とします。なお、本計画に基づき実施する期間においてもモニタリングと評価により、適宜、見直しをかけ進行することとします。

* 中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会（第13回）による

4.2 対象とする範囲

本計画の対象とする範囲は、集水域を含めた湿地全体を対象とします。これは、ラムサール条約湿地の登録範囲と一致しています。




図 中池見湿地保全活用計画の対象とする範囲

※ラムサール条約湿地（越前加賀海岸国定公園 第二種特別地域）と同一の範囲

*範囲の設定…中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会による

5 自然環境保全活用上の問題点

5.1 問題点の整理にあたって

中池見湿地の保全活用にあたっては、平成 23 年度に公益財団法人日本自然保護協会のコーディネートにより、中池見湿地に関わる専門家や地元団体等によるワークショップ（中池見・保全行動計画づくりワークショップ）が開催されています。

ここでは、ワークショップを通じて、また、平成 24 年 9 月～平成 26 年 4 月までの期間に実施された 13 回の中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会を通じて提案された自然環境保全上の問題点と活用上の問題点を整理します。

5.2 自然環境保全上の問題点

平成 23 年度に開催されたワークショップ及び 13 回にわたって実施された準備会において、以下の内容が中池見湿地における自然環境保全上問題点としてあげられました。

問題 1. 保全の体制及び資金の確保

- 保全の方針がない
- 情報共有（イメージ共有）ができていない
- 議論・相談の場がない
- 人手不足
- 後継者不足
- 保全計画に向けての現状把握の費用がない

問題 2. 多様な湿地環境の喪失

- 普通種（ツチガエル）の減少
- 水収支の把握ができていない…水位管理目標がない
- 開水面、湧水地の減少…トンボ類の減少
- イノシシによる掘り返し…湧水・水路が埋められる、法面・畦が崩壊
- 国道 8 号バイパスの影響¹⁾…騒音、光の影響、水質汚染（重金属、油分、塩分）
- 土砂の流入
- 仮設道の沈下
- 新幹線ルートの影響

問題 3. 絶滅に瀕した植物の存在

- 現在の保全作業が適切であるかが不明
- ミズアオイの生育…生育条件の把握
- イノシシによる掘り返し…植生への影響
- シカの食害…植生への影響
- ミズオオバコ、ヒツジグサの復活

問題 4. モニタリング・研究の体制

- 科学的データ不足（水環境（地下水位、湧水、水脈）、絶滅危惧種、両生類、貝類、水草、アブラボテ（二枚貝）、アメンボ（エサキアメンボ、イトアメンボ、ヒメイトアメンボ））
- 収集したデータが活用されていない
- 専門家がいない
- 基礎データ収集のための計画がない

問題 5. 外来生物の侵入

- アメリカザリガニの蔓延
- ミシシッピアカミミガメの生息
- アライグマの生息
- セイタカアワダチソウの生育
- イタチハギの生育
- 外来雑草、外来昆虫の侵入

1) 国道 8 号バイパスの道路排水については、国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所が排水路を設置し、道路排水の中池見湿地への流入はなくなりました。

5.3 活用上の問題点

平成 23 年度に開催されたワークショップ及び 13 回にわたって実施された準備会において、以下の内容が中池見湿地における活用上問題点としてあげされました。

問題 1. 低い認知度

- 広報不足
- 情報発信の場がわからない
- 一般客同士のふれあいの場がない

問題 2. 情報共有・協議の場の確保

- 関係者間での情報の見える化がされていない
- 関係団体の交流の場がない
- 関係団体の協力体制が確立できていない

問題 3. 活用のためのビジョン・ルールの共有

- 啓発用看板の設置（景観の問題）等についてのルールがない
- 環境教育が課題として取り上げられていない
- 法令等による規制が少ない
- マナーの低い利用がある

問題 4. 活用のための人材の確保

- 活用のための人材不足

問題 5. 持続的な活動のための資金の確保

- 活動のための資金がない

[補足] 中池見湿地の外来生物

中池見湿地では、アメリカザリガニ、セイタカアワダチソウ、イタチハギなどの外来生物が多数侵入しており、とくにアメリカザリガニによる甚大な生態系被害が確認されています。これまで、市民活動等によって駆除作業も行われてきており、一部でその成果も出てきていますが、今後の新たな侵入やすでに侵入している外来生物の分布拡大には注意が必要です。

※中池見湿地において特に生態系被害を及ぼしていると考えられる外来生物の例

アメリカザリガニ（水生・湿生植物の食害、それに付随する水生動物の減少）、セイタカアワダチソウ・イタチハギ（既存の在来植物の駆逐・生育環境の占有）等



アメリカザリガニ



セイタカアワダチソウ



イタチハギ

6 中池見湿地の保全活用の方針

6.1 保全活用の目的と将来像

(1) 中池見湿地保全の目的

周りを天筒山、深山、中山で囲まれた中池見湿地には、貴重な泥炭層の上に豊かな自然環境があります。江戸時代に新田開発されて以来、伝統的な水田耕作が営まれ、人と自然が共存した豊かな生態系の中で多様な生き物が育くまれてきました。近年の耕作放棄によりその姿は変化したもの、現代まで受け継がれてきた中池見湿地は、私たちみんなの「宝」であります。かつては私たちの身近にあった里地・里山の風景が衰退し、そこで営まれてきた人と自然の共生、人ととの絆や地域文化の伝承が失われつつあります。このような時代にあって、私たちの大変身近にある貴重な自然環境や人と生き物たちとの営みを未来につなげていくため、中池見湿地を守っていきます。

* 中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会（第2回）による

(2) 中池見湿地の将来像

ラムサール条約の3つの精神（保全・再生、賢明な利用、交流・学習）に基づき、中池見湿地の継続的な保全を行っていきます。人と自然が理想的な共生関係を築き、水田、水溜り、草地などがモザイク状に組み合う多様な水辺環境があつた風景を目指していきます。その中で、環境教育の場、調査・研究の場、交流の場として、たくさんの人々が自然のすばらしさと身近にふれあえる中池見湿地を目指していきます。

* 中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会（第13回）による

6.2 保全の基本方針

中池見湿地は、特有の地形をもちノジコなどの国内有数の渡り鳥の経由地であり、さらに、希少な植物を含む多様な動植物が生息・生育することから、その重要性が国際的にも評価されラムサール条約湿地にも登録されています。このことから、中池見湿地は、まずは、国際的にも評価されている重要性を後世に伝えるべく、自然環境の保全に軸をおき、そのうえで活用を検討することとします。また、その保全・復元の手法を採用するにあたっては、調査・研究に基づいた順応的な管理手法をとることとし、さらに、継続的な保全管理ができるよう、場所の区分や生物の生活史にあわせた季節的な調整も取り入れた保全を検討します。

中池見湿地における保全の基本方針を以下に、また、中池見湿地における保全の目標を次ページにまとめます。

[保全の基本方針]

- 国際的に認められた重要な湿地の一つとして、世界に約束したラムサール登録の要件¹⁾を保全する。
- 中池見湿地を特徴づける多様な動植物の生息・生育環境の保全・復元は、調査・研究に基づいた順応的な管理手法を採用し、保全・復元に際しては、事前・事後の調査（モニタリング）を並行して実施する。
- 中池見湿地の保全・復元の取組は、多様な主体の協働により実施し、市民と共に存する中池見湿地を目指す。

¹⁾ ラムサール登録要件

基準 1：特有の地形・泥炭層の存在

基準 2：国内有数のノジコの渡り

基準 3：2,000 種を超える多様な動植物の存在、デンジソウ、ヤナギヌカボ、ミズトラノオなどの生育

〔補足〕 中池見湿地のラムサール登録要件の“原文”

中池見がラムサール条約に登録された 3 つの要件は、原文では次のように記載されています。

Criterion 1: Within the Japanese Mixed Forest biogeographic region, this type of low moor wetland is uncommon and not widely distributed. This site is a sac-like sediment filled valley and in the central part, an unique approximately 40-meter-deep, nearly continuous peat layer has very deeply accumulated. This allows for an analysis of changes in climate and vegetation during the past one hundred thousand years.

Criterion 2: The Japanese yellow bunting regularly uses this wetland as a migratory spot.

Criterion 3: Within this biogeographic region, the wetland is considered as a hot spot in context of biodiversity and more than 2,000 species of animals and plants inhabit and grow in the area, including many threatened species of aquatic and wetland plants, among which specially *Marsilea quadrifolia* (European Water Clover), *Persicaria foliosa* var. *paludicola*, and *Eustheralis yatabeana* (Japanese Yellow Bunting), are associated with paddy cultivation.

◆中池見湿地における保全の目標

中池見湿地において、上述の保全の基本方針を具体化するため、保全の目標を設定します。中池見湿地の保全の目標は、3つのカテゴリーと10の目標（ターゲット）に展開し、保全活動に取り組みます。

[目標カテゴリー 1] 中池見湿地の基盤となる地形地質・水環境の保全

中池見湿地の景観と動物・植物相を決定している基盤環境については、大規模な人為的変更は認めません。保全の範囲は、湿地本体にとどまらず、集水域などの湿地の生物が利用する周辺息も含めます。

目標 1. 袋状埋積谷の維持

…中池見湿地特有の地形である袋状埋積谷¹⁾を維持します。

目標 2. 泥炭層の維持

…中池見湿地の中央部にある地下約40mにおよぶ泥炭層²⁾を維持します。

目標 3. 多様な水環境の維持

…多様な生物相を育む多様な周辺水域を含む水環境（水路、湧水地、開水面など）を維持します。

[目標カテゴリー 2] 中池見湿地に息づく多様性に富む動植物の保全

現在の動植物相の特徴を維持するため、場所により、手つかずの保存や、伝統的な土地利用の継続など、さまざまな保全策を検討します。動物・植物相に強い影響を及ぼす環境の変化や、外来生物の侵入に対しては、それぞれ適切な対策をとります。

目標 4. 渡り鳥の拠点の維持

…国内有数のノジコ等の渡り拠点としての環境を維持します。

目標 5. 絶滅危惧種を含む多様な生物の保全

…60種を越える絶滅危惧種（鳥類、昆虫類、水生・湿生植物など）と、2,000種を越える動植物が生息・生育する周辺集水域を含む中池見湿地の生物多様性（種の多様性、種内の多様性、生態系の多様性）の生息・生育環境を保全します。

目標 6. 希少な水辺（水田環境）の動植物の保全

…ラムサール条約の登録要件種を中心とした水田環境に生息・生育する動植物が生息・生育できる環境を保全します。

目標7. 模式産地（タイプ産地）の保全

…中池見で採集された動物標本をもとに新種が登録（記載）された種の産地（模式産地（タイプ産地³⁾）の生息・生育環境を保全します。

目標8. 周辺集水域と中池見周辺地域との生態系連結

…中池見湿地と集水域、さらに中池見をとりまく周辺地域との水域・陸域を通じた生態系ネットワークが連結できる環境を維持します。

[目標カテゴリー 3] 中池見湿地の自然を守る技術の伝承

中池見の自然環境の保全に資する水田耕作等の伝統的な土地利用の技術を継承し、将来の保全を担う人材を育成します。

目標9. 伝統的な水田環境及び水田技術の維持

…中池見湿地の多様な生物を育む場とその場の維持のため、多様な主体の連携により中池見湿地の水田環境とその伝統的な水田技術を維持します。

目標10. 将来にわたって中池見を大切にする人材の育成

…中池見湿地の保全と活用に継続的に取り組むため、保全作業と活用、そしてモニタリング等を担う人材を育成します。

¹⁾袋状埋積谷：元の谷地形が厚い堆積物によって埋められたもの

²⁾泥炭層：植物の遺骸が未分解のまま堆積した層

³⁾タイプ産地：生物に学名を与えるときに基準となった標本（模式標本、基準標本）を採集した産地

※中池見湿地は、キタノメダカ (*Oryzias sakaizumi*)、ナカイケミヒメントウ (*Scymnus nakaikemensis*)、タケダウスカゲムシ (*Oosternum takeda*) の模式産地（タイプ産地）です。

■中池見湿地でこれまで確認されたレッドリスト等記載種

◆動物

分類	目名	科名	種名	確認方法		選定根拠 ¹⁾		
				事後調査	既往文献	法令	環境省	福井県
哺乳類	コウモリ	ヒナコウモリ	ヤマコウモリ		○			II類
	ウシ	ウシ	カモシカ	○	○	特天		
鳥類	カモ	カモ	オシドリ	○	○	DD		準絶
			トモエガモ	○	○	VU		II類
			カワアイサ	○	○			要注
	ペリカン	サギ	サンカノゴイ		○	EN	I類	
			ヨシゴイ		○	NT	II類	
			ミヅゴイ	○	○	VU	I類	
			ササゴイ		○			準絶
			チュウサギ		○	NT		準絶
	ツル	クイナ	ヒクイナ		○	NT		I類
チドリ	チドリ	ケリ			○	DD		
		イカルチドリ			○			II類
		コチドリ		○	○			準絶
	シギ	イソシギ		○	○			準絶
タカ	タカ	ミサゴ		○	○	NT	I類	
		ハチクマ		○	○	NT	II類	
		チュウヒ			○	EN	II類	
		ツミ		○	○			準絶
		ハイタカ		○	○	NT	II類	
		オオタカ		○	○	国内	NT	I類
		サシバ		○	○		VU	準絶
		ノスリ		○	○			II類
		クマタカ		○	○	国内	EN	I類
フクロウ	フクロウ	アオバズク			○			II類
ブッポウソウ	カワセミ	ヤマセミ			○			準絶
ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ		○	○			準絶
		ハヤブサ		○	○	国内	VU	II類
スズメ	サンショウクイ	サンショウクイ		○	○	VU	II類	
	カササギヒタキ	サンコウチョウ		○	○			準絶
	モズ	アカモズ			○	EN	II類	
	センニュウ	マキノセンニュウ		○		NT		
	セッカ	セッカ			○			準絶
	ヒタキ	コサメビタキ		○	○			準絶
	ホオジロ	ホオアカ			○			要注
		ノジコ		○	○	NT	II類	
		コジュリン			○	VU	II類	
両生類	有尾	イモリ	アカハライモリ	○	○	NT		
	無尾	アカガエル	トノサマガエル	○	○	NT		
爬虫類	カメ	イシガメ	ニホンイシガメ	○	○	NT		
	有鱗	ナミヘビ	タカチホヘビ		○			要注
			ヒバカリ	○	○			要注
魚類	コイ	コイ	アブラボテ	○	○	NT	II類	
		ドジョウ	ドジョウ	○	○	DD		
			ホトケドジョウ	○	○	EN	I類	
	ダツ	メダカ	キタノメダカ	○	○	VU	II類	
	スズキ	ハゼ	トウヨシノボリ	○	○			準絶
昆虫類	トンボ	イトンボ	ホソミイトンボ		○			II類
			モートンイトンボ		○	NT		
		ヤンマ	ネアカヨシヤンマ		○	NT	II類	
			アオヤンマ		○	NT		準絶

分類	目名	科名	種名	確認方法		選定根拠 ¹⁾		
				事後調査	既往文献	法令	環境省	福井県
昆虫類	トンボ	ヤンマ	カトリヤンマ		○			I 類
		サナエトンボ	キイロサナエ		○		NT	準絶
		タベサナエ			○		NT	準絶
		オグマサナエ			○		NT	II 類
		エゾトンボ	エゾトンボ		○			要注
	トンボ	ハッショウトンボ			○			要注
		キトンボ			○			要注
		マイコアカネ			○			要注
	バッタ	マツムシ	クチキコオロギ		○			要注
	カメムシ	ツチカメムシ	ヨコヅナツチカメムシ		○			要注
		アメンボ	エサキアメンボ		○		NT	準絶
		イトアメンボ	イトアメンボ		○		VU	II 類
		ミズギワカメムシ	トゲミズギワカメムシ		○			要注
		コオイムシ	オオコオイムシ		○	○		準絶
	チョウ	セセリチョウ	ホシチャバネセセリ		○		EN	I 類
		タテハチョウ	オオムラサキ		○		NT	準絶
		アゲハチョウ	ギフチョウ		○		VU	II 類
		ヤガ	キスジウスキヨトウ		○		VU	
	ハエ	ハナアブ	オオヒゲナガハナアブ		○			要注
			スズキナガハナアブ		○			要注
	コウチュウ	オサムシ	スナハラゴミムシ		○		VU	
			タナカツヤハネゴミムシ		○		DD	
			イグチケブカゴミムシ		○		NT	
		ゲンゴロウ	クロゲンゴロウ		○		NT	
			ゲンゴロウ		○		VU	準絶
			コガタノゲンゴロウ		○		VU	I 類
			シマゲンゴロウ		○		NT	
			キベリクロヒメゲンゴロウ		○		NT	
			シャープツブゲンゴロウ		○		NT	
			マルチビゲンゴロウ		○		NT	
		コガシラミズムシ	キイロコガシミズムシ		○		VU	
			クビボソコガシラミズムシ		○		DD	
			マダラコガシラミズムシ		○		VU	
		ガムシ	コガムシ		○		DD	
			ガムシ		○	○	NT	
			シジミガムシ		○		EN	
			タマムシ	サシゲチビタマムシ	○			要注
			テントウムシ	ナカイケミヒメテントウ	○			II 類
			キスイムシ	ガマキスイ	○			要注
			カミキリモドキ	フタイロカミキリモドキ	○			要注
	ハチ	カミキリムシ	ヨツボシカミキリ		○		EN	
			ヤノトラカミキリ		○			要注
		ハムシ	イチモンジハムシ		○			要注
		シリアゲコバチ	オキナワシリアゲコバチ		○			II 類
		アリ	ケブカツヤオオアリ		○	○	DD	II 類
	ドロバチ	ドロバチ	アジアキタドロバチ		○			I 類
		スズメバチ	フカイオオドロバチ		○			II 類
		ベッコウバチ	ヤマトアシナガバチ		○		DD	
		ギングチバチ	アケボノベッコウ		○		DD	I 類
			スギハラベッコウ		○		DD	
			フタモモンベッコウ		○		NT	
		ギングチバチ	タケウチギングチ		○			II 類
			ササキリグングチ		○		NT	
			ニトベギングチ		○		DD	II 類

分類	目名	科名	種名	確認方法		選定根拠 ¹⁾		
				事後調査	既往文献	法令	環境省	福井県
昆虫類	ハチ	ギングチバチ	キユビギングチ		○		DD	II類
		ドロバチモドキ	ヤマトスナハキバチ		○		DD	
		ニッポンハナダカバチ		○		VU	準絶	
		アナバチ	フクイアナバチ		○		NT	準絶
		ミツバチ	クロマルハナバチ		○		NT	
			イカヅチキマダラハナバチ		○			準絶
陸産貝類	中腹足	ヤマタニシ	アツプタガイ		○			II類
	柄眼	オナジマイマイ	エチゼンケマイマイ		○			II類
		キバサナギガイ	クチマガリスナガイ		○		VU	II類
		ナンバンマイマイ	ヤマタカマイマイ	○	○		NT	
底生動物	原始紐舌	タニシ	マルタニシ		○		VU	
			オオタニシ	○	○		NT	
	基眼	モノアラガイ	コシダカヒメモノアラガイ		○		DD	
			モノアラガイ		○		NT	準絶
		ヒラマキガイ	ヒラマキミズマイマイ	○	○		DD	
			ミズコハクガイ	○	○		VU	
	イシガイ	イシガイ	フネドブガイ	○	○			要注
			ヨコハマシジラガイ	○	○		NT	
	マルスダレガイ	シジミ	マシジミ		○		VU	
	トンボ	イトンボ	モートントンボ		○		NT	
		ヤンマ	ネアカヨシヤンマ		○		NT	II類
			アオヤンマ		○		NT	準絶
		サナエトンボ	キイロサナエ	○	○		NT	準絶
			オグマサナエ		○		NT	II類
	トンボ		ハッショウトンボ		○			要注
	カメムシ	コオイムシ	オオコオイムシ	○	○			準絶
	コウチュウ	ゲンゴロウ	クロゲンゴロウ		○		NT	
			ゲンゴロウ		○		VU	準絶
			コガタノゲンゴロウ		○		VU	I類
			キベリクロヒメゲンゴロウ	○	○		NT	
			シャープツブゲンゴロウ		○		NT	
			マルチビゲンゴロウ		○		NT	
		ガムシ	ガムシ	○	○		NT	
			シジミガムシ		○		EN	
合計	33 目	73 科	133 種	43	133	4	87	89

◆植物

区分	科名	種名	確認方法		選定根拠 ¹⁾		
			事後調査	既往文献	法令	環境省	福井県
シダ植物	ヒカゲノカズラ	ヤチスギラン		○			I類
	ミズニラ	ミズニラ	○	○		NT	I類
	トクサ	ミズドクサ		○			準絶
	ハナヤスリ	ハマハナヤスリ		○			I類
	シシガシラ	コモチシダ		○			II類
	オシダ	ナチクジャク		○			I類
	メシダ	ウスバミヤマノコギリシダ		○			準絶
	デンジソウ	デンジソウ	○	○		VU	I類
	サンショウモ	サンショウモ		○		VU	II類
維管束植物	アカウキクサ	オオアカウキクサ		○		EN	I類
	クワ	カラハナソウ		○			準絶
	ヤドリギ	ヒノキバヤドリギ		○			I類
		マツグミ		○			I類
		オオバヤドリギ		○			準絶

区分	科名	種名	確認方法		選定根拠 ¹⁾		
			事後調査	既往文献	法令	環境省	福井県
維管束植物	タデ	ヤナギヌカボ		○		VU	I類
		ノダイオウ		○		VU	II類
	ナデシコ	ハマナデシコ		○			II類
	キンポウゲ	ミスミソウ	○	○		NT	II類
		バイカモ		○			準絶
	スイレン	ジュンサイ		○			準絶
		コウホネ		○			要注
		ヒツジクサ		○			II類
	マツモ	マツモ		○			II類
	ウマノスズクサ	フタバアオイ		○			要注
	オトギリソウ	ヒメオトギリ		○			II類
	モウセンゴケ	モウセンゴケ		○			要注
	アブラナ	ミズタガラシ		○			要注
	ユキノシタ	ギンバイソウ		○			準絶
		モミジチャルメルソウ		○		NT	II類
	バラ	カワラサイコ		○			I類
	モチノキ	クロガネモチ		○			準絶
	ツゲ	ツゲ		○			要注
	クロウメモドキ	ヨコグランキ	○	○			要注
	スミレ	オオバタチツボスミレ		○		NT	
		ヒナスミレ		○			準絶
	ミヅハコベ	ミヅハコベ		○			要注
	ミゾハギ	ミズスギナ		○		CR	
	ヒシ	ヒメビシ	○	○	VU	I類	
	アカバナ	ミズユキノシタ	○	○			II類
	アリトウグサ	フサモ		○			I類
	セリ	ドクゼリ		○			準絶
		ムカゴニンジン		○			準絶
	イチヤクソウ	ウメガサソウ		○			要注
		シャクジョウソウ		○			II類
	ツツジ	ベニドウダン		○			準絶
	サクラソウ	ミヤマタゴボウ		○			II類
		ヤナギトラノオ		○			I類
		クサレダマ	○	○			I類
	リンドウ	リンドウ	○	○			要注
	ミツガシワ	ミツガシワ	○	○			準絶
	ガガイモ	スズサイコ		○		NT	II類
		コカモメヅル		○			準絶
	アワゴケ	ミズハコベ		○			II類
	シソ	ミズネコノオ		○		NT	I類
		ミズトラノオ		○		VU	I類
		ハイタムラソウ		○			II類
		ホナガタツナミソウ	○	○			II類
	ゴマノハグサ	マルバノサワトウガラシ		○		VU	I類
		シソクサ		○			I類
		ヒキヨモギ		○			II類
		オオヒキヨモギ		○		VU	II類
	ハマウツボ	ナンバンギセル		○			要注
		ハマウツボ		○		VU	I類
		キヨスミウツボ		○			I類
	タヌキモ	ノタヌキモ		○		VU	II類
		ミミカキグサ		○			I類
		ホザキノミミカキグサ		○			I類
		イヌタヌキモ		○		NT	

区分	科名	種名	確認方法		選定根拠 ¹⁾		
			事後調査	既往文献	法令	環境省	福井県
維管束植物	タヌキモ	ムラサキミミカキグサ		○		NT	I類
	オミナエシ	オミナエシ		○			準絶
	マツムシソウ	ナベナ		○			II類
	キキョウ	サワギキョウ		○			II類
		キキョウ		○		VU	II類
キク	キク	オケラ		○			準絶
		カガノアザミ		○			II類
		ナガエノアザミ		○			要注
		ワカサハマギク		○		NT	II類
		カセンソウ		○			準絶
		コオニタビラコ		○			II類
		カシワバハグマ	○	○			準絶
		オオニガナ	○	○			II類
		オナモミ		○		VU	
	オモダカ	サジオモダカ		○			II類
		アギナシ		○		NT	II類
トチカガミ	トチカガミ	スブタ		○		VU	I類
		ヤナギスブタ		○			準絶
		トチカガミ		○		NT	I類
		ミズオオバコ		○		VU	準絶
ヒルムシロ	ヒルムシロ	エビモ		○			要注
		オヒルムシロ		○			II類
		ホソバミズヒキモ		○			II類
		イトモ		○		NT	II類
イバラモ	イバラモ	ホッスモ		○			II類
		サガミトリゲモ		○		VU	
		イトトリゲモ		○		NT	I類
ホンゴウソウ	ホンゴウソウ	ホンゴウソウ		○		VU	I類
		ウエマツソウ		○		VU	I類
ユリ	ユリ	オモト	○	○			準絶
		ハナゼキショウ		○			II類
ミズアオイ	ミズアオイ			○		NT	I類
アヤメ	アヤメ	ヒオウギ		○			I類
		ノハナショウブ		○			II類
		ヒメシャガ		○		NT	II類
		カキツバタ	○	○		NT	II類
ヒナノシャクジョウ	ヒナノシャクジョウ			○			I類
イグサ	ドロイ			○			準絶
イネ	イネ	ヒメコヌカグサ		○		NT	準絶
		ヒメザサ		○		NT	I類
		ヌマガヤ		○			準絶
		ヤシャダケ		○			準絶
サトイモ	サトイモ	ショウブ		○			要注
		アシウテンナンショウ		○			要注
		ヒメザセンソウ		○			準絶
ミクリ	ミクリ	ミクリ		○		NT	準絶
		ヤマトミクリ		○		NT	II類
		タマミクリ		○		NT	I類
		ナガエミクリ		○		NT	準絶
ガマ	コガマ			○			準絶
カヤツリグサ	カヤツリグサ	オニスグ		○			II類
		タチスグ		○			要注
		シラコスグ		○			準絶
		オニナルコスグ		○			準絶

区分	科名	種名	確認方法		選定根拠 ¹⁾		
			事後調査	既往文献	法令	環境省	福井県
維管束植物	カヤツリグサ	ミカヅキグサ		○			II類
		イトイヌノハナヒゲ		○			II類
	ラン	エビネ	○	○		NT	II類
		ナツエビネ		○		VU	II類
		キンラン	○	○		VU	II類
		サワラン		○			I類
		クロヤツシロラン		○			I類
		サギソウ		○		NT	絶滅
		ミズトンボ		○		VU	II類
		ジガバチソウ		○			I類
		コクラン		○			II類
		コバノトンボソウ		○			準絶
		トキソウ		○		NT	II類
藻類	カワモズク	アオカワモズク	○	○		NT	準絶
	シャジクモ	シャジクモ		○		VU	I類
		トガリフラスコモ		○		CR+EN	I類
合計	66科	138種	17	138	-	50	133

1) 選定根拠の詳細

法令

- ・文化財保護法…「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）に基づき「特別天然記念物」に指定されている種
- ・種の保存法…「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4 年法律第 75 号）に基づき「国内希少野生動植物種」に指定されている種

環境省…環境省が発表したレッドリスト（環境省、平成 24 年）

[カテゴリー]

- ・絶滅危惧 I 類 (CR+EN) …絶滅の危機に瀕している種
- ・絶滅危惧 I A 類 (CR) …ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種
- ・絶滅危惧 I B 類 (EN) … I A 類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種
- ・絶滅危惧 II 類 (VU) …絶滅の危険が増大している種
- ・準絶滅危惧 (NT) …現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
- ・情報不足 (DD) …評価するだけの情報が不足している種

福井県…「福井県の絶滅のおそれのある野生動物」（福井県、平成 14 年）

「福井県の絶滅のおそれのある野生植物」（福井県、平成 16 年）

[カテゴリー]

- ・県域絶滅危惧 I 類 (I 類)
- ・県域絶滅危惧 II 類 (II 類)
- ・県域準絶滅危惧 (準絶)
- ・要注目 (要注)

資料：「北陸新幹線、中池見湿地付近環境事後調査 中間報告 平成 26 年 7 月 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部 大阪支社」をもとに作表

6.3 活用の基本方針

中池見湿地は、ラムサール条約湿地にも登録された、国際的に誇るべき自然環境を有しています。そして、その保全を世界に約束しています。そこで、中池見湿地の活用は、ラムサール登録の要件を保全することを基本に据えつつ、ラムサール条約でも推奨されている「賢明な利用（ワイス・ユース）」を実現します。

[活用の基本方針]

- ラムサール条約登録湿地として、その保全が確保されつつ湿地への負荷がかからないような活用を検討し、活用自体が保全に結びつくような手法を実現する。
- 中池見が地域の財産であることが皆に認識されるように、市民、地域団体、研究者、行政など、多様な主体による多様な活用を実現する。
- 中池見湿地の魅力を広く伝えるため、市内の他の観光拠点等とのつながりを深め、「敦賀のなかの中池見」であることを市民に理解が進むよう啓発する。

◆中池見湿地における活用の目標

中池見湿地において、上述の活用の基本方針を具体化するため、活用の目標を設定します。中池見湿地の活用の目標は、6つの目標に展開し、中池見の活用に取り組みます。

目標 1. 敦賀が誇る観光スポットとしての活用

…春のサワオグルマ、初夏のカキツバタ、夏のミズトラノオ、秋のオオニガナなど、自然散策をゆっくり楽しむ場としての活用を推進します。

目標 2. 気軽ななかまで参加する田んぼの体験活用

…家族、友人、職場の仲間など、気軽に集える小さな団体による江堀りや田んぼづくりを推進し、田んぼづくりと生物保全の Win-Win の関係を体感いただきます。

目標 3. 「中池見湿地」ブランドを活かした里山のめぐみの販売活用

…ラムサール登録湿地のブランドを活かし、保全活動を通じて得た農産物や、中池見の自然を活かして新たに開発する里山グッズの販売を推進します。

目標 4. イナカで元気に遊ぶ場としての活用

…田んぼや水路で泥んこになったり、木を伐ってみたり、竹トンボをつくったりなど、昔懐かしい遊びの場としての活用を推進します。

目標 5. 里山ライフが楽しめる活用

…中池見湿地にある「自然のもの」「無農薬・無化学肥料の農産物」など里山のめぐみをいかした食・生活体験や「癒しの場」としての活用を推進します。

目標 6. 学校団体、研究機関、企業との協働活用

…小・中学校の田んぼ体験、高校生の里山作業体験と研究の活用、研究機関による里山保全研究、企業による社員教育の場としての活用など、教育的・専門的な活用を推進します。

目標 7. 中池見湿地の活用に関わる人材の育成

…中池見湿地の保全と活用の趣旨を深く理解しつつ、中池見湿地の企画・運営に携わる人材を育成します。

◆中池見湿地における活用の実施例

目標項目	活用の取り組み実施例	備考
目標 1. 敦賀が誇る観光スポットとしての活用	<ul style="list-style-type: none"> ・中池見自然学校 ナイトツアー、ホタルツアー、野外コンサートなど ・ラムサールツアー 中池見湿地・三方五湖・琵琶湖の周遊ツアーなど 	<ul style="list-style-type: none"> ・中池見湿地のグッズ販売、トイレや案内板等の整備等を検討する ・環境・企業ボランティアの導入を検討する
目標 2. 気軽ななかまで参加する田んぼの体験活用	<ul style="list-style-type: none"> ・田んぼ体験 一般市民等小さなグループ対象の小さい区画での田んぼ体験など ・田んぼ体験活動 田下駄・田舟体験、カゴ罠体験 	
目標 3. 「中池見湿地」ブランドを活かした里山のめぐみの販売活用	<ul style="list-style-type: none"> ・里山カフェ 野草茶の提供、お土産販売など ・中池見マルシェ（朝市） 外来種の堆肥、外来種のお茶販売などの物産販売 	<ul style="list-style-type: none"> ・保全のための活動資金を得ることを念頭に取り組む
目標 4. イナカで元気に遊ぶ場としての活用	<ul style="list-style-type: none"> ・いなか体験 肝試し、夜空観察、泥んこ遊び、貝釣りなど 	
目標 5. 里山ライフが楽しめる活用	<ul style="list-style-type: none"> ・女子力アップ教室 リース・ドライフラワーづくり、草木染め体験、漬物づくりなど ・中池見ヒーリング 森林浴、泥パック、湿地セラピー、フラワーヒーリングなど 	
目標 6. 学校団体、研究機関、企業との協働活用	<ul style="list-style-type: none"> ・企業との協働 研究開発、人員支援など ・学校団体・研究機関との協働 田んぼの体験など 	
目標 7. 人材の育成	—	

7 中池見湿地の保全活用計画の概要

7.1 中池見湿地の保全計画の概要

(1) 保全対象とする主要な生物の保全方法の整理

この項では、中池見湿地における保全計画を立案するため、前項の保全の基本方針とそれを具体化する保全の目標（3つのカテゴリーと10個の目標）を達成するための方法を整理します。カテゴリーごとに立案する方法を下にまとめます。

また、中池見湿地においては、絶滅の恐れのある動植物や多様な動植物の保全はより優先順位が高く、中池見湿地の要でもあります。そこで、カテゴリー2の動植物の保全の検討にあたっては、保全のための代表的な種について、保全の手法を詳細に整理します。

カテゴリー1 中池見湿地の基盤となる地形地質・水環境の保全 （目標1～3）

[保全の検討方法]

- 中池見湿地の地形と水環境を良好に維持できるよう検討する。

カテゴリー2 中池見湿地に息づく多様性に富む動植物の保全 （目標4～8）

[保全の検討方法]

- 保全対象となる動植物の生息・生育環境を整理するとともに、その保全のため必要な整備・管理内容を検討する。
- 保全を検討するため、キーストーン種、シンボル種等に該当する種を代表的な種として抽出し、それらの種の保全要件を整理する。

カテゴリー3 中池見湿地の自然を守る技術の伝承 （目標9～10）

[保全の検討方法]

- 中池見の生物多様性を育む水田環境の維持に必要な技術の項目と手法を検討する。
- 継続的に保全が実現できるための担い手の確保の方法を検討する。

表 中池見湿地代表種と環境区分一覧

環境区分	中池見湿地代表種	随伴種
高茎草本群落 ・ヨシ群落 ・マコモ群落	カヤネズミ	ゲンゴロウ類、トンボ類
	ノジコ	ホオジロ類、コヨシキリ、ノゴマ、ノビタキ、センニユウ類、カヤネズミ、ヨシ、ミゾソバ
	ヒクイナ	クイナ、ヨシ、スゲ類
	アオヤンマ	エサキアメンボ、ジュウサンホシテントウ、ジュウクホシテントウ、オオヨシキリ
低茎草本群落	ミズトラノオ	
	サワオグルマ	
開放水面・池	ゲンゴロウ	コガタノゲンゴロウ、クロゲンゴロウ、ガムシ
	キベリクロヒメゲンゴロウ	エサキアメンボ
	カイツブリ	カモ類、バン、カワセミ、ツバメ、池の生物、ガマ類、ヨシ、マコモ
開放水面・溪流	ゲンジボタル	
開放水面・水路	キタノメダカ	ガムシ、ゲンゴロウ類
	アブラボテ	オイカワ、カワムツ、シマドジョウ
水田環境	トチカガミ	ヒメビシ、サンショウモ、ミズオオバコ
	クロゲンゴロウ	コガタノゲンゴロウ、ゲンゴロウ、ガムシ
	ヘイケボタル	
	モートンイトトンボ	ハッチョウトンボ、ネアカヨシヤンマ
	デンジソウ	ミズアオイ、ヒメヒシ、ヤナギヌカボ
	ヤナギヌカボ	
	アカガエル	
森林沢筋	ミゾゴイ	キビタキ、サンコウチョウ、サワガニ、モリアオガエル、ミミズ類
森林	オシドリ	フクロウ、アオバズク、カモ類
	フクロウ	オシドリ、アオバズク
	ギフチョウ	
	オオムラサキ	
湧水地	ホトケドジョウ	ヒツジクサ
	ハッチョウトンボ	

■保全対象とする主要な生物の保全方法の整理 (1/5)

種名	カヤネズミ	ノジコ	ヒクイナ	アオヤンマ	ゲンゴロウ
生息環境	【営巣環境】イネ科（またはカヤツリグサ科）多年性草本類を中心とした高茎草本群落 ヨシ、オギ、セイタカヨシ。チガヤ、スキ、サヤスカガサ、エノコログサ、カサスグ、ヒメガマ等を単独或は複数で構成する一年性草本類も繁茂し、様々な草本類で構成されている草本群落。この為、上層はヨシやオギ、下層は様々な草本類で構成された草本群落、または高茎草本群落の中に低茎草本群落が混生する草本群落が好まれる。	下草のある湿ったヨシ原など林縁部の繁みも利用？	草丈が0.5~2.5mのヨシやスゲ類が生育する、水深10cm以下の湿地環境。	平地から山地の水生植物の豊富な池沼・湿地。ヨシなど高茎の抽水植物が繁茂する池沼を特に好む。	ヒルムシロ、オモダカなどの水生植物の生えた池沼や放棄水田、湿地。
整備内容	群落の状況によって異なる。水深が深いヨシ群落は構成種が少なく、ヨシの程が大きくなり、程密度が下がる。程密度が高いほどカヤネズミは移動し易く、且つ営巣に必要な葉と穂が確保しやすいため、年1回の定期的な刈取りが必要。	現状維持	現状維持	現状維持、ただしヨシ原の水深確保が必要。	水路の浚渫、水深の確保、池の確保。
保全管理	・しぶら道沿いの草刈り（3月） ・観察エリアの草刈り（3月） ・外来植物の除去（6-7月） ※外来植物はセイタカアワダチソウを中心に除去する	乾燥しないように、必要に応じて水の管理を行う。	乾燥しないように、必要に応じて水の管理を行う。	ヨシ原の根元の水深をある程度確保する。	・アメリカザリガニの駆除 ・オモダカなど産卵基質となる植物の保全 ・蛹化場所（土中）の確保
留意事項	作業をする際には専門家と連絡を取り合いながら実施する。草刈り場所と時期について留意が必要。	不明な点が多く、調査中。 作業をする際には専門家と連絡を取り合いながら実施する。	営巣期間中の草刈に注意する。	ヨシが優占することが最も重要であるが、ガマ類などの他の高茎草本が混じる方が良いとされる。	・土中で蛹化するため、幼虫が上陸できる構造を確保する ・アメリカザリガニの駆除にカゴ罠を用いる場合は、混獲に注意する。
付随して保全される種・種群	湿地に生育する草本群落 ゲンゴロウ類・トンボ類	アオジなどのホオジロ類、コヨシキリ、ノゴマ、ノビタキ、センニュウ類など カヤネズミ ヨシ、ミヅソバなど	クイナ ヨシ、スゲ類	エサキアメンボ、ジュウサンホシテントウ、ジュウクホシテントウ、オオヨシキリなど	コガタノゲンゴロウ、クロゲンゴロウ、ガムシなど
備考	一年のうち6月と11月（9-12月）の二度、繁殖期があり、繁殖に影響を与えないよう草刈に留意が必要。しかし、他の湿地依存種への配慮も必要なため、ゾーニングによる対応も視野に入れる。	まずは渡りの拠点として保全するが、繁殖地としての環境も視野に入る。	まずは繁殖地として保全するが、積雪がなければ冬も生息の可能性がある。	2014年に目撃情報があり、本種の生息に適した場所が維持されつつある。	近年の目撃情報がなく、近隣に生息地があるかどうか調査が必要。水田環境の他に外来種のいない池も必要。
参考文献	22、23、24、25、26	17、20	18、19、21	33、34	35、36

■保全対象とする主要な生物の保全方法の整理 (2/5)

種名	キベリクロヒメゲンゴロウ	カイツブリ	キタノメダカ	ア布拉ボテ	トチカガミ
生息・生育環境	ヨシなどが生える比較的大きな池沼。	中池見では、主に池に生息している。	水田や水田付近の用水路といった止水・半止水環境を好む。産卵基質として水生植物などが繁茂していることが望ましい	農業用水路など流速があまり速くない流水環境。とりわけ、湧水のある水域や農業用水路付近の細流を好む	湖沼・ため池・水路などに生育する多年生の浮遊植物。中池見では水路に生育していた他、田面にも発生する。 【水質】やや富栄養化した水域 pH 6.3~6.8 電気伝導度 120~230 μ S/cm 【水深】10~40cm 【流水】止水域を好む
整備内容	現状維持	土砂の投入等によって池ができるおり、冬季に、凍つたり、雪に埋もれたりしないよう、本来の水の流れを復元する。	現状維持	定期的に後谷とそれに連なる水路の一部を浚渫し、水深を確保する。さらに、水生植物等を増やすなど増水時の待避場所を創出することが望ましい	現状維持?
保全管理	水深の確保、ヨシの根際が水につかるようにする	ヨシやガマ等の水草を残す。	農事暦に沿った稲作、かい掘りなどの里山整備作業	枯渇区間が生じないよう、とりわけ夏季に生息水域のモニタリング	◆水路の場合 江ざらい ◆田面の場合
留意事項	・土中で蛹化するため、幼虫が上陸できる構造を確保する ・アメリカザリガニの駆除にカゴ罠を用いる場合は、混獲に注意する。	ヨシやガマ等の水草で浮き巣を作る。繁殖期間が長い。	“メダカ”は市場流通量が多く、遺伝子汚染が生じやすい。中池見湿地内への生物持ち込み禁止を徹底する	産卵基質となる二枚貝の資源量を維持するため、改修時には底質が激変しないよう注意が必要	アメリカザリガニの食害を受けやすく、トチカガミを保全する場所では完全駆除の状態を維持する。
付随して保全される種・種群	エサキアメンボ	カモ類、バン、カワセミ、ツバメ〈ねぐら〉 池の生物 ガマ類、ヨシ、マコモ	水田昆虫（ガムシ・ゲンゴロウ類）	オイカワ、カワムツ、シマドジョウ	◆水路の場合 ◆田面の場合 ヒメビシ、サンショウウモ、ミズオオバコなど
備考	湿地中央部の残土を置いてできた大きな池で多数みられるが、その中でも分布は局地的である。	池が凍つたり、雪が積もりやすい理由を、調査するべき。 カイツブリは、アメリカザリガニを捕食する。	ミナミメダカや鑑賞品種、他水系の個体群が密放流される懸念がある。敦賀市全域での鑑賞品種規制や社会啓発活動を検討、推進するべき	木の芽川に流出する個体が再生産しているか調査し、水系全体での生息実態を解明することが望ましい	秋から冬にかけ、水中茎の先端が殖芽となり水底に沈んで越冬する。
参考文献	35	18、19	1、2、3、5	1、2、3	27、28、29

■保全対象とする主要な生物の保全方法の整理 (3/5)

種名	クロゲンゴロウ	ヘイケボタル	モートンイトトンボ	デンジソウ	ヤナギヌカボ
生息・生育環境	水生植物の生えた池沼、放棄水田、水田の溝など。	水田及び水田水路 【成虫】水田～水路上空を飛翔 【産卵】水田の畦 【幼虫】水田泥質の水底を徘徊するモノアラガイ等を摂食 【蛹】水田の畦の泥中	草丈の低い抽水植物が繁茂した湿地、水田の畦脇、休耕田など	池沼・河川、溝、水田などに生育する多年生の抽水～浮葉植物。中池見では休耕田・現行田に生育。 【水質】pH6.7～7.0、電気伝導度 250～270 μ S/cm 【水深】0～7cm 【流水】無し	河川岸辺、水路、湿地に生育する一年生の湿生植物。中池見では休耕田や畦の周囲に生育。 【水質】pH5.8、電気伝導度 140 μ S/cm 【水深】0～5cm 【流水】無し
整備内容	水路の浚渫、水深の確保、浅い池の確保。	現状維持	水田の創出。	現状維持？	現状維持？
保全管理	・アメリカザリガニの駆除 ・蛹化場所（土中）の確保	水田耕作に準じた田んぼの作業 [春]田起こし、田植え、畔草刈り [初夏]雑草除去	高茎草本の刈り取り、アメリカザリガニの駆除。	伝統的な水田作業に準じる管理作業 *一年草が優占する植生を維持する [春]田起こし、畔草刈り [初夏]雑草除去 特に、多年草の除去 [通年]水深（5cm程度）の維持	伝統的な水田作業に準じる管理作業 *一年草が優占する植生を維持する [春]田起こし、畔草刈り [夏]雑草除去 特に、多年草の除去 [通年]水深（5cm程度）又は湿润環境の維持
留意事項	・土中で蛹化するため、幼虫が上陸できる構造を確保する ・アメリカザリガニの駆除にカゴ罠を用いる場合は、混獲に注意する。	餌となるモノアラガイ等が死滅しないよう一定の水深を確保する。	採集圧にも注意が必要。	サンカクイ、チゴザサ等の低茎の多年草の生育割合が高くなってきたら、強い田起こしの実施と多年草除去により一年草が卓越する植生にリセットする。 ※稻の移植・育成と同時に実施する。	田や水路の畦際に生えることが多く、他の草本類によって被陰されないよう、細かなモニタリングと選択的な除草（ヤナギヌカボの刈り残し）をする。
付随して保全される種・種群	コガタノゲンゴロウ、ゲンゴロウ、ガムシなど		ハッチョウトンボ、ネアカヨシヤンマなど	ミズアオイ、ヒメビシ、ヤナギヌカボなど	
備考	現在も見られるものの個体数は多くない。 例年、ホタル観察会が開催されていること等から、シンボル種（象徴種）として保全する。	成虫が安定的に自然発生することを期待する。	2012年に確認されており、生息に適した環境が戻りつつある。	一旦消失すると、その回復は困難であることから（福井県内で唯一の産地でもある）、①生育地を複数に分散することと、②万一の消失に備えてトレイを用いた植栽などによりバックアップを確保する。	一年草であり、消失も多いことから、複数の場所での生育地を確保することが望まれる。
参考文献	35、36	6、7、8	34	27、28、29、30、31、32	27、28、29、30、31、32

■保全対象とする主要な生物の保全方法の整理 (4/5)

種名	アカガエル	ミヅゴイ	オシドリ	フクロウ	ギフチョウ
生息・生育環境	***作業中***	暗い林を好むが、里山的環境も利用する。 林内の沢筋や水辺等で採食。 生態は不明な点が多い。	林と湿地の両方の環境が必要。	色々なタイプ、特に大きい樹木のある樹林に住む。	山地帯落葉広葉樹林 【成虫】早春のみ出現し春植物を吸蜜 産卵時には林床を低く飛ぶ 【産卵】カンアオイ類の葉に産卵 【幼虫】カンアオイ類の葉を食べる
整備内容		保水力のある林を維持する。	現状維持。 大木、特に樹洞のある木を残す。	現状維持。 大木、特に樹洞のある木を残す。	直近過去の生息確認位置において、生息環境を再生する。
保全管理		沢等がある、暗い林を、V字型の地形ごと保全する。	繁殖するための樹洞のある木や、樹洞ができそうな大径木を残す。	繁殖するための樹洞のある木や、樹洞ができそうな大径木を残す。	低木や草本が鬱閉しないよう開けた林床を維持する。 [秋]下草刈り ※毎年実施する。 ※ツツジ類等の吸蜜植物は残す。
留意事項		繁殖していそうな場所への立入に注意する。	営巣場所が不足しているようであれば、復元できるまでの間、巣箱の設置を検討する。	営巣場所が不足しているようであれば、復元できるまでの間、巣箱の設置を検討する。	下草刈りの際には、吸蜜植物となるツツジ類やスミレ等の植物を刈り取らないよう留意する。 一度に個体数が増加した際には、幼虫の過密化による食草の食いつくしに留意をする。
付随して保全される種・種群		暗い林を好む、キビタキ、サンコウチヨウなど。 サワガニ、モリアオガエル、ミミズ類	樹洞を利用するフクロウ、アオバズク等。 池等を利用するカモ類等。	樹洞を利用するオシドリ、アオバズク等。	
備考		日本でのみ繁殖する夏鳥で、希少種。	雑食性だが、特にドングリを好む。	基本的にはむ夜行性で、ネズミ類等を捕食する。 樹上や地上に営巣することもある。	食草密度が高く、林縁に近く、低木密度が低い場所を好む生態特性に応じた保全管理を要する。
参考文献		18、19	18、19	17、20	9、10、11

■保全対象とする主要な生物の保全方法の整理（5/5）

種名	オオムラサキ	ホトケドジョウ	ハッチョウトンボ	ゲンジボタル
生息・生育環境	落葉広葉樹林 【成虫】クヌギ、ナラ類の樹液を吸蜜木のまわりを飛翔 【産卵】エノキの葉に産卵 【幼虫】エノキの葉を採食	湧水や伏流水が流れ込み、夏季に水温が低く保たれる半止水域に生息する。底質中に身を潜められる泥質・砂泥質を好む	湧水湿地や谷戸の休耕田 【成虫】水辺に隣接する草地 【産卵】浅く小さな解放水面 【幼虫】低茎草原の浅滞水地の泥土中 【水環境】1.0~3.0 cmの水深で貧栄養な水質の開放水面	流れのある水路環境 【成虫】飛翔・休憩場所となる木陰 【産卵】水際にコケが生育 【幼虫】流れがありカワニナが豊富に生息 【蛹】中州や岸がある
整備内容	現状維持	生息地の一部の、放棄田となっている地点を水田環境へ復帰させることが望ましい	直近過去の生息確認位置において、生息環境を再生する。	現状維持
保全管理	林縁部を中心に、低木や草本が鬱閉しないよう開けた林床を維持する。 [秋]下草刈り 間伐 ※ギャップを形成し、飛翔できる空間を確保する	生息地の水深を維持するため、湧水付近の掘り下げ。猪の泥浴びやアメリカザリガニの侵入による攪乱の防除	小規模な開放水面を伴うヤノネグサ・イボクサ群落やイ・ヒメジソ群落などの低茎草原を維持する。 [秋]草刈り（10月下旬～11月） ※1回/4年程度で初期植生に更新	[春]水路の泥揚げ ※幼虫が蛹化したタイミングを見計らって実施する [初夏、夏、秋]水路際の草刈り
留意事項	冬季、地表に落葉した葉の裏面で幼虫が越冬していることがあることから、これを除去しないよう留意する	わずかな湧水量の低下でも枯渴に繋がりかねないため、平行して施設内の継代飼育を実施する	ススキ等の高茎草原への遷移がすさまないよう管理を要するが、生息地周囲のやや粗生したイ・ススキ群落は成虫の給餌・休息場所として利用される。	草刈りは、成虫の発生が終わる頃以降に実施する。
付随して保存される種・種群		ヒツジクサなど水田雑草類		
備考	樹木が生長・老衰すると樹液の滲出が悪くなるため、クヌギ等は萌芽再生せ、樹勢を若返らせることも必要である。	確認されている生息範囲がきわめて狭い（約 84m ² ）ため、湿地内での新たな生息場所の創出を検討するべき	複数の場所で生息環境を維持することで、安定的な保全が確保できる可能性がある。	成虫が安定的に自然発生することを期待する。 例年、ホタル観察会が開催されていること等から、シンボル種（象徴種）として保全する。
参考文献	12、13	1、3、4	15、16	6、7、8

※保全対象とする主要な生物の保全方法の整理に用いた参考文献

No.	タイトル	発行機関等	発行年	著者
1	The current status of freshwater fishes in the Naka-ikemi Wetland, Fukui Prefecture, Japan	Biogeography	2014 (In press)	Kitagawa, T. et al.
2	日本の淡水魚	山と渓谷社	1989	川那部浩也・水野信彦 編・監修
3	福井県中池見湿地に生息する淡水魚類	地域自然史と保全	2013	山野ひとみ ほか
4	福井県中池見湿地におけるホトケドジョウの生息現況	魚類学雑誌	2013	北川哲郎 ほか
5	<i>Oryzias sakaizumii</i> , a new ricefish from northrn Japan (Teleostei..Adrianichthidae)	Icthyol. Explor Freshwaters	2011	Asai, T., H. Senou, K. Hosoya
6	ホタル百科	丸善出版株式会社(東京)、112pp.	2004	東京ゲンジボタル研究所
7	ホタルの里づくり	信山社サイテック(東京)、136pp.	1991	自然環境復元協会
8	水田周辺の人為水系における水生昆虫の生活	水辺環境の保全－生物群集の視点から－(朝倉書店、東京)、111－124	1998	日比伸子、山本知巳、遊磨正秀
9	ギフチョウ (<i>Luehdorfia japonica</i>) の産卵環境選択	長野県環境保全研究所研究報告 3 : 21—25	2007	尾閑雅章、須賀丈、浜田崇、岸元良輔
10	白馬村オリンピック滑降競技会場付近のギフチョウ生息地の保全	長野県環境保全研究所 研究プロジェクト成果報告8 「長野冬季五輪開催から10年後のモニタリング」: 27-32	2009	須賀丈、尾閑雅章、浜田崇、岸元良輔
11	自然を守るとはどういうことか	農山漁村文化協会(東京)、260pp	1988	守山弘
12	蝶相からみた大津市瀬田丘陵(龍谷の森)の特徴。	「里山から見える世界」龍谷大学里山学・地域共生学才一ツノ・リサーチ・センター2005年次報告書: 189-202	2006	遊磨正秀、宮浦富保、横田岳人
13	里山の管理とチョウ群集の多様性	蝶と蛾 60 (1) : 52- 62	2009	田下昌志
14	荒廃した里山を蘇らせる 自然生態修復工学入門	農山漁村文化協会(東京)、161pp.	2002	養父志乃夫
15	ハッショウトンボ生息地の保全に関する生態学的研究	造園学会誌 60 (4) : 324-328	1997	養父志乃夫、中島 敦司
16	丘陵湿地に生息するハッショウトンボの場所利用と生息場所の保全について	保全生態学研究 9 : 25-36	2004	上田哲行、木下栄郎、石原一彦
17	原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉	株式会社保育社	1995	中村登流、中村雅彦
18	原色日本野鳥生態図鑑〈水鳥編〉	株式会社保育社	1995	中村登流、中村雅彦
19	日本動物大百科 第3巻 鳥類 I	株式会社平凡社	1996	日高敏隆 ほか
20	日本動物大百科 第4巻 鳥類 II	株式会社平凡社	1997	日高敏隆 ほか
21	ヒクイナ調査結果報告	認定NPO法人バードリサーチ	2010	平野敏明
22	多摩丘陵におけるカヤネズミ生息適地の景観構造	ランドスケープ研究、No. 69/5, 553-556	2006	黒田貴綱・勝野武彦
23	中池見湿地におけるカヤネズミの巣分布と資源利用	福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告書、pp. 209-223.	2003	畠佐代子・三谷功・上野山雅子・川道美枝子・千々岩哲・川道武男
24	カヤネズミの淀川水系における営巣適地の要因と連続性	第53回日本生態学会大会講演要旨、292p	2006	畠佐代子・夏原由博
25	堤防植生の刈り取りがカヤネズミ <i>Micromys minutus</i> の営巣に与える影響	ランドスケープ研究、No. 68/5, 571-574	2005	澤邊久美子・畠佐代子・夏原由博
26	再び九州産カヤネズミの繁殖期について	哺乳類科学 No.3/5, 125-127	1967	白石哲
27	日本水草図鑑	文一総合出版(東京) 179pp.	1994	角野康郎
28	ネイチャーガイド 日本の水草	文一総合出版(東京) 326pp.	2014	角野康郎
29	敦賀基地環境保全エリア構築準備調査 報告書	大阪ガス(大阪) 197pp.	1997	プレック研究
30	水生植物および湿生植物の保全を目的とした耕作放棄水田の植生管理	ランドスケープ研究 63 (5) : 491-494	2000	関岡裕明、下田路子、中本学、水澤智、森本幸裕
31	復田を組み入れた休耕田の植生管理	ランドスケープ研究 65 (5) : 585-590	2002	中本学、関岡裕明、下田路子、森本幸裕
32	中池見(福井県)における耕作放棄湿地の植生と絶滅危惧植物の動態	日本生態学会誌 53 : 197-217	2003	下田路子、中本学
33	都市近郊における希少種アオヤンマの生息条件と生息場所間のネットワーク	環動昆 18(3), 123-131	2007	河瀬直幹・夏原由博
34	近畿のトンボ図鑑	いかだ社、東京 239pp	2009	山本 哲央、宮崎 俊行、西浦 信明、新村 捷介
35	改訂版 図説 日本のゲンゴロウ	文一総合出版、東京	2002	森正人・北山昭
36	稻作水系における水生昆虫の季節消長と移動	講談社サイエンティフィク、東京 242pp	2005	西城 洋

(2) 保全を実現するための配置計画

中池見の保全のための整備・管理の検討は、絶滅危惧種、その他中池見を特徴づける代表的な種の配置として検討します。

そのため、代表的な種の現在の位置図、及びその生息・生育を支える基盤としての水環境の情報をベースに、維持する環境条件として、目標植生図を設定します。目標植生図は、下図の流れで作成し、その結果を次ページの図に示します。なお、動植物の分布情報については、種の保全のため本図書に付属する資料からは省いています。





図 目標植生図作成の流れ



7.2 中池見湿地の活用計画の概要

(1) 活用方法の整理

この項では、中池見湿地における活用計画を立案するため、前項の活用の基本方針とそれを具体化する活用の目標を達成するための方法を整理します。


[活用の検討方法]

- 保全のために必要なさとやま管理を基盤においていた活用メニューを検討する。
- 一方、参加する方々が楽しみながら取り組めるような活用方法を検討する。
- 多様な主体がそれぞれに持つニーズが充足するような活用メニューを検討する。
- 保全・活用を推進するための体制・資金を獲得できる方法を検討する。

(2) 活用を実現するための配置計画

中池見の活用のための整備・管理の検討は、自然環境の保全を優先にしつつ、市民みんなが活用できるような配置として検討します。

活用を実現するための配置計画を次ページの図に示します。




(3) 中池見湿地の保全・活用マップ

これまでとりまとめた中池見湿地の保全マップ、及び活用マップを重ねあわせ、中池見湿地における保全活用マップを作成しました。

このマップでは、中池見湿地における保全と活用の方向性が示されており、このマップをもとに、今後の詳細な計画を立案します。

中池見湿地の保全活用マップを次ページの図に示します。



8 中池見湿地の維持管理・モニタリング計画

(1) 維持管理計画

中池見湿地における保全の目標を達成し、さらに永続的に維持するためには、維持管理を要します。中池見湿地における維持管理は、前項までの保全のために必要な事項を満たすため、植生管理図の区分をベースに、その区分ごとに維持管理の項目、時期、実施方法等を整理します。

[維持管理計画立案の方針]

- 保全の目標を達成しつつ、円滑な活用が展開できるよう計画立案する。
- 多様な動植物の基盤としての植生を中心に整理した環境区分ごとに、維持管理の項目・方法等を整理する。
- 実際の維持管理作業の実施に際しては、この中池見湿地保全活用構想・計画の策定の後に作成する中池見湿地保全活用実施計画において詳細に計画を作成する。また、各年次において、関係者間で詳細に計画を確認・調整しながら実施する。

1) 水門の管理

中池見湿地の表流水は、概ね西から東に流れしており、かつては、江尻に設置されている水門によって制御されていました。この水門の制御によって表流水の水位が変動し、ひいては動植物の生息・生育に影響します。ここでは、水門管理の今後の方向性を設定し、詳細な計画については中池見湿地保全活用実施計画において詳細に計画することとします。

[水門管理の考え方]

- 中池見湿地における動植物の保全目標が達成できるように水門を管理する。
- 現在の水門は、水中に生息する動物の移動阻害となっていることから、修理整備を行う際には水中に生息する動物の移動が可能になるよう配慮する。
- 水門の管理と同時に水位の計測も行い、その計画と推移については、関係者間で情報共有する。また、水門管理については、関係者間で協議し、担当者を設置する。



図 水門の位置

2) 外来生物への対策

中池見湿地においては、アメリカザリガニ、セイタカアワダチソウをはじめとする外来生物の生息・生育が確認されており、特にこの2種は、中池見湿地の生態系被害を及ぼしています。

ここでは、外来生物への対策についての計画概要を設定します。

[外来生物対策の考え方]

- 中池見湿地において、アメリカザリガニ、セイタカアワダチソウをはじめ、甚大な生態系被害を及ぼす外来生物については、除去や増殖しない対策等を講じます。
- これらの外来生物は、完全に除去することは困難であるとしても、生態系に悪影響がないレベルまで（生息密度などを）低下させることを目標とします。
- 中池見湿地において、今後、新たな外来生物の被害が発生しないよう、注意します。

3) 環境区分ごとの植生管理

中池見湿地における多様な動植物の生息生育は、多様な水環境と多様な植生を基盤に成立していると考えられます。そこで、保全対象とする動植物の生息・生育分布や植生区分を中心に整理した環境区分ごとに、維持管理の項目・方法等を整理します。

なお、ここでは大まかな維持管理方法の整理にとどめ、詳細な計画は、今後作成する中池見湿地保全活用実施計画において計画立案します。

表 中池見の植生の景観イメージ

目標植生	景観イメージ	保全される動植物の例	
		動物	植物
高茎草原	草丈の高いヨシ、マコモなどが一面に広がる。一見するとヨシ、マコモが一様に広がっているように見えるが、所々で低茎草原が点在したり、下層の植生が多様な類型となっている。	カヤネズミ、ノジコ、ヒクイナ、ノビタキ、アオヤンマなど	—
低茎草原	スゲ類やチゴザサなど、草丈の低い草本類が広がる草原。優占する植物は、立地により異なり、低茎草原にも多様な類型がみられる。 場所によっては、早春にサワオグルマが一面に咲き広がる。	カヤネズミなど	ミズトラノオ、オオニガナ、サワオグルマなど
水田環境	稻が植えられた水田景観。 一方、稻が植えつけられておらず、草丈の低い植物が優占する「管理休耕」のタイプがある。	クロゲンゴロウ、ヘイケボタル、モートンイトトンボ、アカガエルなど	デンジソウ、ヤナギヌカボなど
水路	一年を通じて水が流れる。 場所によって淀んだ場所や、流れの急な場所など多様な類型の水路が存在する。	キタノメダカ、アブラボテ、ゲンジボタルなど	—
池沼	水をたっぷりと湛えた水面。 水ぎわには、草丈の低いスゲ類が優占するか、ヨシやマコモなどの草丈の高い草本類が水際に群生する。	カイツブリ、ゲンゴロウなど	—
里山	コナラをはじめとする多様な落葉広葉樹が混交する高木が優占する樹林。 所々にスギ林が点在する。	フクロウ類、オシドリ、ギフチヨウ、オオムラサキ	キンランなど

表 中池見湿地維持管理計画の概要（1/2）

環境区分	中池見湿地 代表種	維持管理の内容			
		項目	方法	時期	留意点
高茎草本群落 ・ヨシ群落 ・マコモ群落	カヤネズミ、ノジコ、ヒクイナ、アオヤンマ	草刈り (群落周囲)	草刈り機を用いて、道沿いや水路際などを刈り取る 初夏刈区と秋刈区を設けて実施する	6～7月 9月	ノジコ、ヒクイナ生息地では作業前に鳥類専門家と調整する
		外来植物除去	三角ホーカワを用いて根茎から除去する	6～8月	なるべく根茎から除去するよう留意する
低茎草本群落	カヤネズミ、ミズトラノオ、サワオグルマ	草刈り	草刈り機を用いて、地際より刈り取る	6月	刈り草は、所々に集積させる
開放水面・池	ゲンゴロウ、キベリクロヒメ ゲンゴロウ、カイツブリ	—	—	—	特に管理を要しないが、現在の水面が維持できているか留意する
開放水面・ 渓流	ゲンジボタル	水域周囲の 草刈り	草刈り機を用いて、地際より刈り取る	9月	ホタルが地中で蛹化している期間とノジコ等の鳥類が繁殖する期間は作業しない
		泥あげ	クワで川底に堆積した土砂をかき上げる	4～5月	ホタルの幼虫が水路内で生息している期間は作業しない。
開放水面・ 水路	キタノメダカ、 アブラボテ	江ざらい	クワで水路中に堆積した泥をかき上げる	3月	
		草刈り	草刈り機を用いて、地際より刈り取る	4、6、9月	カキツバタ、ミツガシワなど、保全対象とする草本類は刈り残す
		土手の改修	崩壊した土手を木杭や横矢板をあてて補修する	1回/数年	保全対象とする草本類が生育する場合は避けるか、移植等対策をとる

表 中池見湿地維持管理計画の概要 (2/2)

環境区分	中池見湿地 代表種	維持管理の内容			
		項目	方法	時期	留意点
水田環境	トチカガミ、クロゲンゴロウ、ハイケボタル、モートンイトトンボ、デンジソウ、ヤナギヌカボ、アカガエル	田起こし	耕運機を用いて、水田表土をブラウの回転によって細かく碎く	4月	アカガエル類の幼生の出現状況を確認しながら実施する
		代かき	田に水を張り、耕運機を用いて、水田表土をブラウの回転によってさらに細かく碎き、トンボで均す	4月	稻を移植する際には、移植 10 日前までに実施し、その後は湛水させる
		畔草刈り	草刈り機を用いて、地際より刈り取る	4、6、8月	田んぼの活動がしやすいよう実施時期等適宜調整する 稀少な植物の生育がある場合は刈り残す
		除草	人手により、増えすぎた(増えすぎそうな)水田雑草を除去する。例:ヒエ類、コナギ、オモダカ類など	6、7月	ミズアオイ、ヒメビシ等、希少な植物は残すよう配慮する
		水管理	代かき～稻刈り前までの期間、湛水を続ける。湛水は、5cm 以上を目標に維持する。	4～8月	稻刈り後も、まばらな湛水条件を維持する
森林沢筋	ミヅゴイ	—	—	—	特に管理を要しないが、繁殖しているような場所へは立ち入らない
森林	オシドリ、フクロウ、ギフチョウ、オオムラサキ	下草刈り	カマ・草刈り機を用いて地際より刈り取る ギフチョウの吸蜜植物や幼虫の餌となるツツジ類・エチゼンカンアオイなどは刈り残す	1回/数年 (秋)	作業用具は、吸蜜植物や餌植物の生育状況にあわせて選択する
		間伐	樹木が良好に成長するよう密度管理を行いながら、チェーンソーを用いて樹木の根元から切り倒す	1回/数年	オシドリの餌資源となる堅果類、及びオシドリ・フクロウの営巣地となる樹洞があるばあいには残す
湧水地	ホトケドジョウ、ハッチョウ、トンボ	泥あげ	ホトケドジョウが生息できる水環境として、数 cm 以上の水深を維持するよう泥あげを行う	1回/数年	数 m ² 以上の範囲をかき出し、下流側の水路と接続するよう配慮する 急速な流れが生じないよう留意する
		草刈り	[ホトケドジョウ生息地] 数 cm 以上の水深が維持できるよう、繁茂した草をカマ等をもちいて除去する [ハッチョウトンボ生息地] 1～3cm の水深を維持しながら、まばらに植物が生える草原として維持する	10月下旬～11月	1回/4年程度の頻度で初期植生に更新する 植生の状況によって耕運機による表土かくはんを検討する

(2) モニタリング計画

中池見湿地保全活用構想・計画をもとに活動を推進するとともに、活動による効果検証を行うために、水環境・動植物を対象にしたモニタリングを実施することとします。中池見湿地の保全活用構想・計画に沿って立案された保全の目標が維持されているか、あるいは外来生物の新たな移入等の不具合が生じていないかなど、モニタリングによって明らかにします。また、モニタリングの結果をもとに、不具合が確認された場合には、どのように対処するか検討し、維持管理に反映させます。

[モニタリング立案の方針]

- 保全の目標達成の程度が評価できるよう、かつ、継続して実施できるようなモニタリング計画を立案する。
- 「モニタリングサイト 1000」をはじめ、これまで実施してきたモニタリングを継続する。
- 実際のモニタリングの実施に際しては、この中池見湿地保全活用構想・計画の策定の後に作成する中池見湿地保全活用実施計画において詳細に計画を作成する。また、各年次において、関係者間で詳細に計画を確認・調整しながら実施する。

表 中池見湿地モニタリング計画の概要 (1/2)

モニタリングのねらい	モニタリング項目	モニタリングの内容		留意点
		方法	時期	
水環境の確認	地下水位	簡易な観測井戸を設置し、地下水の変動を目視確認するとともにデータを記録する	1回/月	
	地表水位・水質	測定地を設け、簡易測定器を用いて pH、水温等を計測する	4~6回/年	
中池見湿地の概観の推移の把握	相観植生	中池見湿地全体を対象に、最新の空中写真の判読とともに、高台からの見通しと現地踏査によって、相観区分した植生を地図上に記載する	1回/5年	
動植物の出現傾向の把握	センサーカメラ撮影	モニタリングサイト 1000 の調査位置と方法を継続する また、森林（や林縁）に改善を加える場所については、事前と事後にカメラを設置して比較する	事前 1年間 事後最低 2年間	

表 中池見湿地モニタリング計画の概要（2/2）

モニタリングのねらい	モニタリング項目	モニタリングの内容		留意点
		方法	時期	
動植物の出現傾向の把握	ホタル類	モニタリングサイト 1000 の調査位置と方法を継続する	—	—
	カエル類	モニタリングサイト 1000 の調査位置と方法を継続する	—	—
	動物相調査	哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫類を対象に、各項目において捕獲・目視確認により生息している種をリストアップする	1回/10年 ※通年	
	植物相調査	中池見湿地内をくまなく踏査し、生育している植物をリストアップする	1回/10年 ※通年	
保全目標としている種の発生の把握	カヤネズミ等哺乳類	モニタリング 1000 の調査位置と方法を継続する		調査規模についてでは要検討
	ノジコ等鳥類	***他の項目も含め、項目・調査方法等は検討中***		
	夜行性鳥類調査			
	メダカ・タナゴ調査			
	希少昆虫調査			
	稀少植物調査			

9 中池見湿地の保全活用の推進しくみ

9.1 保全活用の推進の流れ

(1) 中池見湿地の保全活用検討協議会（仮称）の設置

中池見湿地の保全活用構想・計画は、地元住民、農林業関係者、環境保全団体、慣行関係者、教育関係者、企業等が協働して取り組むこととします。中池見湿地の保全活用の推進にあたっては、「中池見湿地保全活用検討協議会（仮称）」を設置し、この協議会が核となり、保全活用に関する連絡調整や進捗確認等を進めることとします。




図 中池見湿地の保全活用を推進する仕組み

(2) 計画（維持管理・モニタリング）の実施フロー

中池見湿地保全活用構想・計画の内容に基づき、実施する際には、モニタリングを重ねながら、進捗状況をチェック・評価します。その評価結果をもとに、必要な計画見直しを検討することとします。

(3) 計画見直しのスケジュール

この構想・計画は、中池見湿地の保全活用の理念をとりまとめたものとして、中長期的にわたって維持することとします。一方で、この構想・計画をとりまとめたのちに作成する保全活用の実施計画については、概ね、5年を目安に進捗状況の確認と適宜改定を加えることとします。また、その改訂作業にあたっては、今後設置をする中池見湿地保全活用検討協議会（仮称）において議論し、進めることとします。

なお、この構想・計画は、敦賀市の上位計画である市の総合計画と環境基本計画等とも連動して取り組むこととします。

9.2 保全活用に関わる役割分担

中池見湿地保全活用構想・計画を実施するにあたっては、その内容にかかる役割分担をいたします。前項で述べたように、中池見湿地の保全活用には、中池見湿地に関わるすべての主体が力を合わせ、協働して取り組むこととします。

具体的な作業項目と役割分担については、下表のように設定します。

表 中池見湿地保全活用に関わる役割分担 ***イメージ表***

	項目	N P O	N P O	一 般 市 民	研 究 者	林 業 関 係 者	農 業 関 係 者	商 工 関 係 者	觀 光 事 業 者	教 育 機 關	企 業	行 政
保 全	中池見の多様性を守るための維持管理											
	通常のモニタリング											
	研究的モニタリング											
	技術伝承・人材育成											
活 用												
	観光活用											
	里山体験活動											
	里山のめぐみ販売活用											
	遊び場としての活用											
	里山ライフを楽しむ活用											
	団体活用											
全 体	中池見湿地保全活用検討協議会（仮称）の推進											

資 料 編

◆資料1 第2次敦賀市環境基本計画での位置づけ

中池見湿地は、平成25年3月に敦賀市が策定した第2次敦賀市環境基本計画において、第3章（みんなの目標）のうち、第1項（みんなが自然と歴史文化を育みます）、及び、第4項（みんなが環境を考え行動します）において、以下の記載があり、中池見湿地の保全を進めることと、身近な自然とのふれあいのための活用の場として中池見湿地が位置づけられています。

★ 中池見湿地の保全

平成24年7月、中池見湿地はラムサール条約湿地に登録されました。

周りを天筒山、深山、中山で囲まれた中池見湿地には、貴重な泥炭層の上に豊かな自然環境があります。江戸時代に新田開発されて以来、伝統的な水田耕作が営まれ、人と自然が共存した豊かな生態系の中で多様な生き物が育まれてきました。60種以上の絶滅危惧種を含む約3,000種の動植物が確認されている中池見湿地は、まさに生き物たちの宝庫であると言えます。

近年の耕作放棄によりその姿は変化したもの、現代まで受け継がれてきた中池見湿地は、みんなの「宝」です。

かつては身近にあった里地里山の風景が衰退し、そこで営まれてきた人と自然の共生、人と人との絆や地域文化の伝承が失われつつあります。このような時代にあって、私たちの大変身近にある貴重な自然環境や人と生き物たちとの営みを未来につなげていくため、中池見湿地を守っていきます。

出典：「第2次敦賀市環境基本計画」（敦賀市、平成25年3月）※p.26

★ 身近な自然とのふれあい

身近にある自然とのふれあいや遊びを通じて、まずは自然への興味、関心、理解を深めることが環境教育・環境学習の第一歩となります。市民の余暇時間の増大や余暇活動の多様化が進む中、スポーツ、レクリエーションとしてだけでなく、市民農園やガーデニングなどを通じて農作業体験を行うなど、自然とのふれあいに対する需要はますます拡大しています。

本市には、野坂山や西方ヶ岳などの山林や敦賀平野などの農地、池河内湿原やラムサール条約湿地に認定された中池見湿地、越前加賀海岸国定公園や若狭湾国定公園の海岸など非常に豊かで多様な自然環境があります。

そこで、自然との積極的なふれあいを楽しむ人が増える中で、遊敦塾や中池見湿地での自然観察会など、幅広いニーズに対応した多様な自然とのふれあいの場や機会を提供していきます。

出典：「第2次敦賀市環境基本計画」（敦賀市、平成25年3月）※p.35

◆資料2 近年の中池見湿地の保全・管理現状況


平成22年度より敦賀市がNPO法人中池見ねっとに委託し、実施している湿原保全の状況について、以下にまとめます。

① 中池見調査研究事業

本事業では、中池見希少動植物保全区画周辺、ふれあいの里等における植物調査等の調査、及び希少動植物の域内保全や獣害及び外来生物の影響に関する研究、希少動植物保全区画の維持管理、外来生物防除等の中池見希少動植物保全事業、並びに中池見の自然環境保全・利活用を目指した活動への支援等が行われています。現地で実施されている事業のうち、概要を以下にまとめます。

[中池見希少動植物保全事業]

中池見湿地においては、希少な動植物が集中的に生息・生育する場所の保全を目的に「生物多様性重点区域」を設定し、保全管理（選択的草刈り、外来生物防除、排水路整備、部分的な耕起かく乱など）とモニタリングが行われています。



市民による中池見の保全・管理・活用事業位置図

[植物の調査]



中池見湿地では、平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月の期間において、253 種類の植物が確認されています。そのうち、絶滅の恐れのある種類（環境省レッドリスト、福井県レッドデータブック記載種）として 13 種（イチョウウキゴケ、カキツバタ、キンラン、デンジソウ、ヒメビシ、マルバノサワトウガラシ、ミクリ、ミズアオイ、ミズタガラシ、ミズトラノオ、ミズトンボ、ミツガシワ、ヤナギヌカボ）が確認されています。また、オオオアレチノギク、セイタカアワダチソウ、セイヨウタンポポなどの外来植物も確認されています。

[水質の調査]

中池見湿地における生き物の生息環境を整備する上で必要な基礎データを蓄積するため、水路の水位が計測されています。

■計測地点

- ①湿地全体の水門
- ②中央の水路（中江）3 地点
- ③七曲（沈下池）
- ④堀切水路の下流地点



※本項内容は、いずれも「市民による中池見の保全・管理・活用事業 年間報告書（平成 25 年度）」（特定非営利活動法人 中池見ねっと、平成 26 年）から抜粋編集しています。

引用・参考文献

※編集中途中です（記載不順）

No.	資料名	著者・発行者	発行年
1	中池見湿地のラムサール条約登録と新幹線問題. ラムネット J ニュースレター 11: 1	浅野正富	2013
2	国立環境研究所研究報告 第 176 号 福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告 2003	独立行政法人 国立環境研究所	2003 年
3	福井市自然史博物館研究報告第 58 号 65-66 中池見湿原におけるキトンボの記録	藤野勇馬、和田茂樹	2011 年
4	福井市自然史博物館研究報告第 59 号 47-50 中池見湿地で確認された福井県初記録の淡水貝類 4 種	藤野勇馬、金尾滋史	2012 年
5	福井県の絶滅のおそれのある野生動物 2002 福井県レッドデータブック（動物編）	福井県	2002 年
6	福井県の絶滅のおそれのある野生植物 2004 福井県レッドデータブック（植物編）	福井県	2004 年
7	福井県地質図（2010 版）	福井県	2010
8	敦賀市樫曲（中池見湿地）で採集した有剣蜂類. 福井虫報 No. 11	羽田義任、野坂千津子	1992 年
9	中池見湿地における水生動物の多様性とその変化. 地域自然史と保全 35(1) : 11-15	平井規央、森岡賢史、石井実	2013 年
10	中池見湿地における水生動物の多様性とその変化. 地域自然史と保全 35: 11-15	平井規央、森岡賢史、石井実	2013
11	Taxonomic notes of the Genus Oosternum (Coleoptera: Hydrophilidae) from Japan. The Memoirs of the Research and education Center for Regional Environment, Fukui University, (12) : 1-9	Hoshina, H. and Satô, M.	2005
12	福井大学地域環境研究教育センター研究紀要「日本海地域の自然と環境」No. 14 1-16 中池見湿原に生息する水生昆虫類の現状	保科英人、魚見陽香、寺嶋美乃、山田千穂	2007 年
13	敦賀市樫曲でキアシマエダテバチを採集. 福井虫報 No. 11	飯田忠嗣	1992 年
14	福井県敦賀市中池見における農業と雑草、人とのかかわりについて. 京都大学農学部卒業論文. 京都大学農学部. 京都	池田里絵子	1977
15	敦賀市中池見の湿田農耕と絶滅危惧種. 農耕の技術と文化 23: 43-69	池田里絵子、三浦勲一	2000
16	NPO 法人ウエットランド中池見ホームページ 「モニタリング 1000 里地チョウ類調査報告」	池上博	
17	中池見湿地の植物相の多様性と保全の意義. 日本生態学会誌 48: 163-166	角野康郎	1998
18	新幹線ルートと中池見湿地の水生植物—危惧される影響. 地域自然史と保全 35: 103-104	角野康郎	2013
19	平成 25 年度モニタリングサイト 1000 里地調査報告書	環境省自然環境局生物多様性センター	2014
20	本邦雑草の種類および地理的分布に関する研究. 第 4 報. 水田雑草の地理的分布と発生度. 農学研究 39 : 143-154	笠原安夫	1951

No.	資料名	著者・発行者	発行年
21	池田・三浦「敦賀市中池見の湿田農耕と絶滅危惧種」コメント. 農耕の技術と文化 23: 69-72	加藤真	2000
22	中池見湿地と周辺地域のほ乳類相と生態（1）中池見・内池見湿地と周辺地域の丘陵帶（天筒山、中山、深山）の哺乳類相、野原精一・河野昭一編, 福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告 2003	川道美枝子、千々岩哲、畠佐代子、横畠泰志、三谷功、上野山雅子、久保田裕之、笛木智恵子、川道武男	2003
23	福井県中池見湿地におけるホトケドジョウの生息現況. 魚類学雑誌 60(1) : 27-33	北川哲朗、増田茂、森下匠、小田優花、細谷和海	2013
24	福井県敦賀市中池見湿地における両生・爬虫類相. 爬虫・両棲類学会報 2000 (2): 85-88	神松幸弘、辻彰洋、野崎健太郎	2000
25	中池見湿地の生物多様性と保全の意義. 日本生態学会誌 48: 159-161	河野昭一	1998
26	中池見湿地及び周辺の蘇苔類. 福井総合植物園紀要第4号 : 39-44	黒田明穂、松本淳、若杉孝生	2006
27	敦賀市樫曲の中池見湿地で観察された水生昆虫. 福井虫報 No. 10	松村俊幸	1992
28	福井県・敦賀市、中池見湿原堆積物の層相と年代—過去5万年の堆積環境の変遷—. 地学雑誌 104 (6) : 865-873	宮本真二、安田喜憲、北川浩之	1995
29	Paleoenvironment in the last glacial maximum around the Naka-Ikemi Moor, Fukui Prefecture, Central Japan. Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University, (31): 131-147	Miyamoto, S., Yasuda, Y. and Kitagawa, H.	1996
30	中池見湿地（敦賀市）の自然	ナチュラリスト敦賀 緑と水の会	1996
31	聞き書き中池見今昔	ナチュラリスト敦賀 緑と水の会資料室 編	2011
32	敦賀市樫曲のトンボ(1)(2). 福井虫報 No. 2	長田勝	1988
33	樫曲のオサムシの記録. 福井虫報 No. 3	長田勝	1988
34	敦賀市樫曲のクロスジギンヤンマ. 福井虫報 No. 8	長田勝	1991
35	耕作放棄水田の埋土種子集団—敦賀市中池見の場合—. 日本綠化工学会誌 26: 142-153	中本学、名取祥三、水澤智、森本幸裕	2000
36	生物保全に配慮した池沼の造成—造成後3年間のモニタリング結果—. 日本綠化工学会誌 27: 355-356	中本学、関岡裕明	2001
37	福井県敦賀市 中池見湿地総合学術調査報告（国立環境研究所研究報告 No. 176). 国立環境研究所 つくば.	野原精一、河野昭一 (編)	2003
38	中池見湿地（福井県敦賀市）における浮遊藻群落の季節遷移とその特徴. 陸水学雑誌 59: 329-339	野崎健太、辻彰洋、神松幸弘、石川俊之、山本敏哉	1998a
39	中池見湿地の水生生物相と水環境の関係. 日本生態学会誌 48: 187-192	野崎健太郎、辻彰洋、神松幸弘、山本敏哉、平澤理世、石川俊之	1998b
40	NPO 法人ウエットランド中池見ホームページ 「モニタリングサイト 1000 中池見カヤネズミ調査報告 中池見湿地哺乳類調査について」	NPO 法人ウエットラン ド中池見 田代美津子	
41	中池見フォーラム 2014	NPO 法人中池見ねっと 資料及び発表内容	2014

No.	資料名	著者・発行者	発行年
42	Structure of the waste-filled valleys and associated crustal movements at the eastern part of the Tsuruga Plain, north of Lake Biwa. Paleolimnology of Lake Biwa and Japanese Pleistocene, 6: 66-80.	Okada, A.	1974
43	敦賀 LNG 基地建設事業に係る環境影響評価書	大阪ガス株式会社	1996
44	中池見湿原で思うこと. あらがえこ第 48 号	斎藤寛昭	2010
45	遺稿集 奇跡の泥炭湿原 中池見湿地	斎藤慎一郎	2008
46	地質学・地形学的に見た中池見湿地の特徴—その形成史を中心に—、野原精一・河野昭一編, 福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告 2003	坂巻幸雄	2003
47	キンヒバリ (バッタ目) を敦賀市中池見で採集. 福井虫報 No. 10	佐々治寛之	1992
48	福井大学積雪研究室研究紀要「日本海地域の自然と環境」No. 3 15-36 福井県敦賀市中池見湿地の昆虫相とその自然環境保全の提言	佐々治寛之、岸本修	1996
49	福井県敦賀市中池見湿地の昆虫相とその自然環境保全の提言 付 テントウムシ科昆虫の新種記載と生活史. 福井大学積雪研究室研究紀要「日本海地域の自然と環境」 3: 15-36	佐々治寛之、岸本修	1996
50	中池見湿地並びにその周辺地域の昆虫相 (1) 中池見湿地と丘陵地帯の昆虫相、生息環境の保全問題, 野原精一・河野昭一編, 福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告 2003	佐々治寛之、長田勝、室田忠男、岸本修	2003 年
51	身近で貴重な「中池見湿地」を守る. 日本自然保護協会 (編) 「生態学からみた里やまの自然と保護」 pp. 216-217. 講談社サイエンティフィク, 東京.	笹木智恵子	2005
52	北陸新幹線中池見ルートーアセスメントの内容並びに今回計画の概要と問題点. 地域自然史と保全 35: 5-10	笹木智恵子	2013
53	冬季の中池見湿地 (福井県敦賀市) における近年の高い電気伝導度. 陸の水 60: 41-43	笹木智恵子、笹木進、河端良齊、村上哲生	2013
54	ラムサール条約登録「中池見湿地」エリア通過の北陸新幹線問題. 環境と正義 160: 10-12	笹木進	2013
55	NPO 法人ウェットランド中池見ホームページ 「中池見湿地の概要と調査活動の取り組み」	笹木進	
56	中池見における水田雑草保全の取り組み—3 年間のまとめ—. 水草研究会報 71: 10-16	関岡裕明、下田路子、中本学	2000
57	水生植物および湿生植物の保全を目的とした耕作放棄水田の植生管理. ランドスケープ研究. 日本造園学会誌 63: 585-590	関岡裕明、下田路子、中本学、水澤智、森本幸裕	2002
58	Paleoenvironments in the last glacial maximum around the Naka-ikemi moor, Fukui Prefecture, Central Japan. Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University 31:131-147.	Shinji MIYAMOTO, Yoshinori YASUDA, and Hiroyuki KITAGAWA	1996
59	福井県敦賀市中池見の農業と植生、および維持管理試験について. 植生情報 2 : 7-18	下田路子	1998
60	深田の植物—敦賀市中池見の場合—. 水草研究会報 66: 1-9	下田路子、宇山三穂、中本学	1999
61	中池見(福井県)における耕作放棄湿田の植生と絶滅危惧植物の動態. 日本生態学会誌 53 : 197-217	下田路子、中本学	2003
62	水田の生物をよみがえらせる	下田路子	2003 年

No.	資料名	著者・発行者	発行年
63	水田の生物・生態系は守れるのか—中池見を例に. 下田路子「水田の生物をよみがえらせる」pp. 169-200. 岩波書店, 東京.	下田路子	2003
64	浦底一柳ヶ瀬山断層帯の帶状・規模と過去の活動に関する検討. 活断層・古地震研究報告 12 : 149-193	杉山雄一、坂本泉、滝野義幸、宇佐見琢哉、岸本弘樹、永田高弘	2012
65	Oryzias sakaiumii, a new ricefish from northrn Japan (Teleostei..Adrianichthidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, 22(4) : 289-299	Toshinobu Asai, Hiroshi Senou, and Kazumi Hosoya	2011
66	中池見湿地（福井県敦賀市）における水質環境と生物群集. 陸水学雑誌 60: 201-213	辻彰洋、唐崎千春、神松幸弘、山本敏哉、村山恵子、野崎健太郎	1999
67	敦賀市史通史編 上巻	敦賀市	1985
68	若狭沿岸, 敦賀市中池見の埋没林とその放射性炭素年代. 植生史研究 2: 29-30	植田弥生、辻誠一郎	1994
69	中池見湿地並びにその周辺地域の昆虫相（4）中池見湿地のトンボ相とその現状, 野原精一・河野昭一編, 福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告 2003	和田茂樹	2003 年
70	福井県中池見湿地に生息する淡水魚類. 地域自然史と保全 35(1)	山野ひとみ、曾田茂、北川哲朗、武内啓明、川瀬成吾、野口亮太、小西雅樹、田中大喜、森下匠、池田昌史、井藤大樹、乾偉大、小田優花、細谷和海	2013 年
71	中池見湿原（敦賀市）の植物. 福井の科学者 NO. 70	横山俊一、福永吉孝、明石英章	1994 年
72	中池見湿地と周辺地域の鳥類（1）鳥類相と季節変動, 野原精一・河野昭一編, 福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告 2003	吉田一朗、三原学、横山大八	2003 年
73	NPO 法人ウエットランド中池見ホームページ 「中池見湿地の鳥類モニタリング 1000 里地調査・鳥類」	吉田一朗	

※資料名は、著者のアルファベット順に記載しています。

※環境省版レッドリストについては、環境省自然環境局生物多様性センターのサイト (<http://www.biodic.go.jp/>) をもとに、平成 26 年 9 月 1 日時点の最新情報を参照しました（平成 24 年 8 月、及び平成 25 年 2 月に公表された第 4 次レッドリストを参照しました）。

中池見湿地保全活用構想・計画

策定までの経緯

(1) 中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会

平成 23 年度に実施された「中池見・保全行動計画づくりワークショップ」をうけて、中池見湿地の保全活用についての話し合いの場を設けることとなり、中池見ラムサール条約湿地保全・活用協議会（仮称）設置準備会（全 13 回）が開催されました。

[準備会参加者]

●公益財団法人 日本自然保護協会

保全研究部長 朱宮 文晴 保全研究部 福田 真由子

●特定非営利活動法人 ウェットランド中池見

理事 服部 清子	会員 飯田 親子	会員 吉田 一朗
理事 横山 恵子	会員 桑本 順子	会員 池上 博
理事 笹木 進	会員 三好 由美子	自然公園指導員 笹木 智恵子
理事 田代 美津子	会員 千々岩 哲	中池見を伝える女たちの会 今大地 晴美

●特定非営利活動法人 中池見ねっと

代表理事 岡本 正治	理事 増田 茂	会員 高木 ツル子	運営委員 中川 香織
代表理事 藤木 康夫	理事 山本 真	会員 高木 みさ子	事務局長 上野山 雅子
代表理事 田上 猛	理事 坂口 信男	会員 藤木 まさ子	監事 岩寄 賢司
理事 高木 光夫	理事 宮本 恵二	会員 平松 浩二	
理事 筒井 宏行	会員 小部 千代次	会員 岡本 忠義	

●特定非営利活動法人 ラムサール・ネットワーク日本

共同代表 柏木 実 事務局長 浅野 正富

●株式会社 環境アセスメントセンター 敦賀事務所 *第 11 回以降出席

所長 関岡 裕明 主任 坂口 奈美

●福井県

自然保護センター 所長 多田 雅充
自然環境課 主任 田中 和弘 自然環境課 主査 中屋 健史

●敦賀市環境課

政策幹 平野 栄久	課長補佐 宮本 裕一	主事 高野 貴広
政策幹 山本 孝雄	係長 西澤 達也	館長 山本 信一
課長 田辺 辰浩	主事 山中 裕泰	館長 宮口 広見

■準備会会議開催経緯

※開催場所…第 1~3、5~7、9~3 回：敦賀市役所別館 2 階 第 4 会議室、第 4 回：中池見人自然のふれあいの里、第 8 回：プラザ萬象 会議室 3

開催回	開催日程	開催回	開催日程	開催回	開催日程
第 1 回	平成 24 年 9 月 14 日	第 6 回	平成 25 年 4 月 24 日	第 11 回	平成 26 年 2 月 25 日
第 2 回	平成 24 年 10 月 10 日	第 7 回	平成 25 年 5 月 28 日	第 12 回	平成 26 年 3 月 25 日
第 3 回	平成 24 年 11 月 21 日	第 8 回	平成 25 年 6 月 26 日	第 13 回	平成 26 年 4 月 22 日
第 4 回	平成 24 年 12 月 17 日	第 9 回	平成 25 年 7 月 25 日	—	—
第 5 回	平成 25 年 3 月 28 日	第 10 回	平成 25 年 11 月 8 日	—	—

(2) 中池見湿地保全活用計画策定委員会

『中池見湿地保全活用計画』は、中池見湿地に関わる関係者及び研究者等から構成する「中池見湿地保全活用計画策定委員会」の意見を踏まえながら議論をかさね、策定しました。

[中池見湿地保全活用計画策定委員会委員名簿]

平成〇年〇月〇日

区分	氏名	所 属	役職等
委員長	村上 哲生	名古屋女子大学 家政学部	教授
副委員長	山本 博文	福井大学 教育地域科学部	教授
副委員長	笛木 進	NPO 法人 ウエットランド中池見	事務局
委員	伊原 俊治	敦賀市立咸新小学校	校長
委員	上塙 知巳	敦賀美方農業協同組合 営農部営農課	課長
委員*	常富 豊	環境省中部地方環境事務所	統括自然保護企画官
委員	岡本 正治	NPO 法人 中池見ねっと	代表理事
委員	角野 康郎	神戸大学大学院 理学研究科 生物学専攻	教授
委員	坂口 秀富	樺曲農家組合	組合長
委員	多田 雅充	福井県自然保護センター	所長
委員	中道 五一	泉生産森林組合	組合長理事
委員	野坂 雄二	福井県安全環境部	企画幹（自然環境）
委員	平井 規央	大阪府立大学 生命環境科学研究科	准教授
委員	福田 真由子	公益財団法人 日本自然保護協会	-
委員	細谷 和海	近畿大学 農学部環境管理学科 水圏生態学研究室	教授
委員	前田 凱彦	れいなん森林組合	副組合長
委員	室 敬士	敦賀商工会議所	副会頭
委員	和田 辰治	一般社団法人 敦賀観光協会	事務局長

*前任の遠藤 誠委員（環境省中部地方環境事務所 野生生物課 課長）から交代

【事務局】 政策推進課 池田課長、観光振興課 若杉課長、農林水産振興課 大北課長、教育政策課 伊原課長、文化振興課 川村課長、都市政策課 山田課長、環境・廃棄物対策課 田辺課長・宮本課長補佐・西澤係長・村田係長・高野主査・小島技師・糸野主事、株式会社 環境アセスメントセンター 関岡裕明

■委員会会議開催経緯

開催回	開催日程	場所
第1回	平成26年 5月21日	敦賀市役所 4階 講堂
第2回	平成26年 11月12日	東公民館 1階 ホール
第3回	平成26年 2月 日	



委員会議論

(3) 中池見湿地保全活用計画策定委員会ワーキンググループ

中池見湿地保全活用計画策定委員会では、中池見湿地保全活用計画の策定にあたり、より広く意見を得るためのワーキンググループを開催しました。

ワーキンググループには、中池見湿地関係者や一般市民、委員等、約 40 名が参加し、中池見湿地の保全活用の方針等について活発に議論しました。

■ワーキンググループ開催経緯

開催回	開催日程	場所	出席者数
第 1 回	平成 26 年 7 月 7 日	中池見湿地	31 名
第 2 回	平成 26 年 8 月 7 日	敦賀市東郷公民館	25 名
第 3 回	平成 26 年 9 月 2 日	敦賀市東郷公民館	26 名
報告会	平成 26 年 10 月 8 日	敦賀市東郷公民館	23 名
第 4 回	平成 27 年 1 月 日		



[写真提供] 本冊子に掲載されている写真は、次の方々が撮影されたものです。

上野山雅子、NPO 法人 ウエットランド中池見、北川哲郎、千々岩哲、NPO 法人 中池見ねつと、公益財団法人 日本自然保護協会、増田茂、山野ひとみ、吉田一朗

(五十音順、敬称略)

中池見湿地保全活用計画【構想・基本計画】策定 H26年度スケジュール表

資料 - 4

平成26年11月12日 市民生活部 環境・廃棄物対策課

中池見湿地保全活用計画【実施計画】策定 H27年度スケジュール表

項目	27年								28年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
中池見湿地保全活用計画策定								計画【実施計画】(案)取りまとめ			計画【実施計画】(案)にパブコメ反映	
策定委員会		第4回 策定委員会 (下旬を予定) ●計画【実施計画】の 策定方針・方法等につ いて検討						第5回 策定委員会 (上旬を予定) ●計画【実施計画】(案)の提示及び意見 聴取 ●パブリックコメント等 スケジュールの説明			第6回 策定委員会 (下旬を予定) ●パブコメの意見結果 の説明 ●計画(案)の最終と りまとめ	市長へ答申 (下旬を予定)
ワーキング グループ			第5回 ワーキンググループ ●計画【実施計画】(案)の検討	第6回 ワーキンググループ ●計画【実施計画】(案)の検討	第7回 ワーキンググループ ●計画【実施計画】(案)の検討				第8回 ワーキンググループ (下旬を予定) ●第5回策定委員会 の検討結果、パブ リックコメントを踏まえ ての意見取りまとめ			
パブコメ実施 時期									第5回の結果を反映し た計画【実施計画】(案)の送付及びパブ リックコメントの実施(1 2月上旬締め切り)			
中池見ラムサール 条約湿地保全・活 用協議会(仮称) 設置準備会												

実施計画の策定にあたっては、十分な時間を要するとの判断からスケジュールを変更する。

- 会議の開催回数を増加。
委員会2回→3回、ワーキング3回→4回
- 計画の印刷・製本を次年度送り。
H27年度→H28年度